

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Borocaina gola 1,5 mg pastiglie gusto arancia
Borocaina gola 1,5 mg pastiglie gusto ciliegia
Borocaina gola 1,5 mg pastiglie gusto albicocca

cetilpiridinio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Borocaina Gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Borocaina Gola
3. Come usare Borocaina Gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Borocaina Gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Borocaina Gola e a cosa serve

Borocaina Gola contiene il principio attivo cetilpiridinio cloruro ed appartiene ad una categoria di farmaci detti antisettici del cavo orofaringeo (bocca e gola), utilizzati per la cura dei sintomi delle malattie infiammatorie della bocca, della gola e delle gengive.

Borocaina Gola è indicata per la disinfezione della mucosa orofaringea (bocca e gola).

Borocaina Gola:

- ha un'azione disinfettante e un'azione antibatterica (elimina i batteri).
- agisce rapidamente e con un effetto prolungato.

Le pastiglie di Borocaina Gola, dal gradevole sapore, procurano sollievo e danno una piacevole sensazione di fresco.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Borocaina Gola

NON usi Borocaina Gola

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- nei bambini al di sotto dei 12 anni, salvo diversa prescrizione medica.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Borocaina Gola

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico.

È opportuno consultare il medico nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Bambini

Borocaina Gola non deve essere utilizzata in bambini di età inferiore ai 12 anni, salvo diversa prescrizione medica.

Altri medicinali e Borocaina Gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non usi Borocaina Gola contemporaneamente ad altri disinfettanti (antisettici) e prodotti per la pulizia (detergenti) della bocca e della gola.

In caso stiate usando altri medicinali, chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Borocaina Gola deve essere somministrato in gravidanza e durante l'allattamento solo in caso di necessità e sotto il diretto controllo del medico, perché non vi sono dati riguardanti l'uso del principio attivo cetilpiridinio cloruro in donne in gravidanza.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Borocaina Gola contiene zucchero (saccarosio)

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come usare Borocaina Gola

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 6 ore fino ad un massimo giornaliero di 4 pastiglie.

Non superare le dosi indicate.

Le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca per mantenere il più a lungo possibile la mucosa del cavo orofaringeo sotto l'azione del medicinale.

Usare solo per periodi brevi di trattamento.

Se prende più Borocaina Gola di quanto deve

Avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino in caso di ingestione accidentale di una dose superiore a quella raccomandata.

I sintomi di intossicazione dovuti all'ingestione di grandi quantità di farmaci come Borocaina Gola, comprendono:

- nausea, vomito,
- difficoltà respiratoria (dispnea), colorazione bluastra della pelle e delle mucose (cianosi), soffocamento (asfissia),
- riduzione dell'attività del sistema nervoso centrale (depressione del SNC),
- pressione bassa (ipotensione) e coma.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati molto raramente:

- reazioni di intolleranza locale quali bruciore o irritazione

Sono stati segnalati sporadicamente:

- irritazione temporanea delle gengive
- nausea, vomito
- dolore allo stomaco
- infiammazione della mucosa della bocca (stomatite)
- modifiche del gusto
- leggera modifica del colore dei denti
- infiammazione allergica della pelle (dermatite)

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Borocaina Gola

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non usi questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Borocaina Gola

- Il principio attivo è cetilpiridinio cloruro. Una pastiglia contiene 1,5 mg di cetilpiridinio cloruro.
- Gli altri componenti sono magnesio stearato, saccarosio, silice amorfa precipitata, aromi naturali. Vedere paragrafo 2: “Borocaina Gola contiene zucchero (saccarosio)”.

Descrizione dell’aspetto di Borocaina Gola e contenuto della confezione

Borocaina gola si presenta in forma di pastiglie ed è disponibile in confezioni da 20 pastiglie nei gusti arancia, ciliegia, albicocca.

E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Alfasigma S.p.A. – Viale Sarca, n. 223 – 20126 Milano (MI)

Produttore:
Alfasigma S.p.A. – Via E. Fermi, n. 1 – 65020 Alanno (PE)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agosto 2017

Agenzia Italiana del Farmaco