

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Agenzia Italiana del Farmaco

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### Neo Borocillina Sedativo Tosse 30 mg/ml gocce orali, soluzione

Destrometorfano bromidrato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Neo Borocillina Sedativo Tosse e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse
3. Come prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina Sedativo Tosse
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Neo Borocillina Sedativo Tosse e a cosa serve**

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene il principio attivo destrometorfano, che appartiene alla categoria dei farmaci sedativi (calmanti) della tosse.

Neo Borocillina Sedativo Tosse è usato come sedativo della tosse secca (calma la tosse).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse**

##### **NON prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse:**

- se è allergico al destrometorfano o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha l'asma, la bronchite cronica (BPCO), la polmonite, difficoltà respiratorie o depressione respiratoria;
- se ha malattie cardiovascolari o soffre di pressione del sangue elevata;
- se soffre di ipertiroidismo (aumento di funzione della ghiandola tiroide);
- se ha il diabete;
- se soffre di aumento della pressione all'interno dell'occhio (glaucoma);
- se ha disturbi urinari causati dall'ingrossamento della prostata o da altre ostruzioni di organi genitali o delle vie urinarie;
- se ha ostruzioni dell'esofago, dello stomaco o dell'intestino;
- se ha gravi malattie del fegato;
- se soffre di epilessia;
- se sta prendendo farmaci antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi (IMAO) o se ha interrotto questo trattamento da meno di due settimane (vedere "Altri medicinali e Neo Borocillina Sedativo Tosse");
- se è in gravidanza, in particolare nel primo trimestre (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento");

- se sta allattando con latte materno (vedere il paragrafo “Gravidanza e allattamento”);
- se ha problemi ereditari di intolleranza ad alcuni zuccheri (per la presenza di saccarosio tra gli eccipienti; vedere il paragrafo “Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene saccarosio”);
- nei bambini di età inferiore a 2 anni.

### Avvertenze e precauzioni

**Questo medicinale può portare a dipendenza. Pertanto il trattamento dovrà essere di breve durata.**

Prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse con cautela e solo dopo aver consultato il medico:

- se presenta tosse irritante con una notevole produzione di muco (catarro);
- se presenta malattie del fegato; in caso di dubbio consulti il medico;
- se ha una storia di abuso di farmaci o sostanze psicoattive;
- se ha alcune particolari caratteristiche genetiche per le quali metabolizza lentamente questo medicinale.

È opportuno consultare il medico anche se tali disturbi si sono già presentati in passato.

### Bambini

Neo Borocillina Sedativo Tosse è controindicato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Usi Neo Borocillina Sedativo Tosse nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### Altri medicinali e Neo Borocillina Sedativo Tosse

Parli con il medico o il farmacista prima di assumere Neo Borocillina Sedativo Tosse.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare informi il medico se lei sta assumendo o ha recentemente assunto:

- medicinali appartenenti alla classe degli inibitori della monoaminoossidasi (MAO) (vedere paragrafo 2 “NON prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse”) come:
  - medicinali per il trattamento della malattia di Parkinson (per esempio selegilina o rasagilina)
  - medicinali antidepressivi o antipsicotici: (isocarboxazide, nialamide, fenelzina, tranilcipromina, iproniazide, iproclozide, moclobemide e toloxatone)

Neo Borocillina SedativoTosse può interagire con questi medicinali e si possono verificare alterazioni dello stato mentale (ad es. agitazione, allucinazioni, coma) e altri effetti come temperatura corporea superiore a 38°C, aumento frequenza cardiaca, disturbi della respirazione, pressione arteriosa instabile, esagerazione dei riflessi, rigidità muscolare, mancanza di coordinazione e/o sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea) anche quando il trattamento con questi farmaci è stato interrotto da meno di 2 settimane;

- medicinali per il trattamento dell’ansia o dell’insonnia (ipnotici, sedativi o ansiolitici), in quanto possono aumentare gli effetti del destrometorfano sul sistema nervoso centrale.
- i seguenti medicinali, in quanto possono aumentare i livelli di destrometorfano nel sangue inibendone il metabolismo:
  - medicinali per trattare la depressione come fluoxetina, paroxetina, sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2. “Non prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse”);
  - medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza nei casi di dipendenza (metadone);
  - medicinali per trattare le malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina, perfenazina);
  - medicinali per trattare i disturbi del ritmo del cuore (amiodarone, chinidina, propafenone);
  - medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
  - medicinali per ridurre il livello di calcio nel sangue e trattare una disfunzione dell’organismo

- dovuta ad una ridotta secrezione dell'ormone che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;
- medicinali usati per impedire lo sviluppo dei funghi (miceti) (terbinafina).

L'uso concomitante di Neo Borocillina Sedativo Tosse e di medicinali sedativi quali benzodiazepine o medicinali correlati ad esse aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando altre opzioni di trattamento non sono possibili. Tuttavia, se assume Neo Borocillina Sedativo Tosse insieme a medicinali sedativi, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere stabilite dal medico. Informi il medico riguardo a tutti i farmaci sedativi che sta prendendo e segua attentamente la raccomandazione sulla dose del medico. Può essere utile informare amici o parenti di prestare attenzione ai segni e sintomi sopra indicati. Si rivolga al medico qualora manifesti tali sintomi.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse con alcool**

Se sta prendendo Neo Borocillina Sedativo Tosse deve evitare l'uso di bevande alcoliche e di medicinali contenenti alcool: l'alcool aumenta l'effetto sedativo del destrometorfano con possibile riduzione del livello di attenzione (vedere il paragrafo "Guida di veicoli e utilizzo di macchinari").

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

Non usi Neo Borocillina Sedativo Tosse nel primo trimestre di gravidanza; nei mesi successivi usi il farmaco solo in caso di necessità, dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto beneficio / rischio nel proprio caso.

#### Allattamento

Non usi Neo Borocillina Sedativo Tosse durante l'allattamento poiché non è noto se il farmaco passa nel latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Neo Borocillina Sedativo Tosse può dare sonnolenza, che può influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari, specialmente in concomitanza con l'assunzione di alcool o di altri medicinali che possono rallentare i tempi di reazione.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene etanolo (alcool)**

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene 60 vol % di etanolo (alcool), ad es. fino a 474 mg per dose da 20 gocce equivalenti a 12 ml di birra o 5 ml di vino.

Può essere dannoso negli alcolisti. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene sodio**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

### **Per chi svolge attività sportiva**

La presenza di alcool etilico tra i componenti di questo medicinale può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

## **NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA**

La tosse secca è un sintomo che frequentemente accompagna le malattie da raffreddamento e gli stati influenzali; è dovuta allo stato infiammatorio delle vie respiratorie e non è accompagnata da produzione di

mucosità e/o catarro. La tosse secca aumenta di frequenza e di intensità durante la notte, quando il paziente è sdraiato, infastidendo il sonno e peggiorando lo stato di infiammazione delle vie aeree. La presenza di aria secca, la respirazione a bocca aperta e la posizione supina stimolano gli accessi di tosse. Per prevenire gli accessi è opportuno umidificare correttamente gli ambienti e favorire la respirazione nasale.

### 3. Come prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni: 10 - 20 gocce, 3 - 4 volte al giorno.

20 gocce corrispondono ad 1 ml di soluzione e contengono 30 mg di destrometorfano bromidrato.

Le gocce devono essere diluite in poca acqua. Per aprire la confezione premere e contemporaneamente girare, per chiuderla avvitarla a fondo premendo.

Non superare le dosi indicate.

Non prendere per più di 5-7 giorni.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### Uso nei bambini

- Bambini dai 6 ai 12 anni: 5 - 10 gocce, 2 volte al giorno.
- Bambini dai 2 ai 6 anni: 5 gocce, 2 - 3 volte al giorno.
- Nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età Neo Borocillina Sedativo Tosse deve essere somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

#### Se prende più Neo Borocillina Sedativo Tosse di quanto deve

Popolazione pediatrica

Nei bambini in caso di sovradosaggio possono verificarsi eventi avversi gravi, inclusi disturbi neurologici.

Le persone che si prendono cura dei pazienti non dovranno superare la dose raccomandata.

Se si assume più Neo Borocillina Tosse del dovuto, si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea e vomito, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, confusione, senso di vertigini, sonnolenza, disturbi cognitivi, movimenti oculari involontari e rapidi, disturbi cardiaci (battito cardiaco accelerato), abbassamento della pressione del sangue, disturbi di coordinazione, psicosi con allucinazioni visive e ipereccitabilità.

Altri sintomi in caso di sovradosaggio massivo possono essere: impossibilità ad urinare, coma, gravi problemi respiratori e convulsioni.

Rivolgersi al medico o all'ospedale immediatamente se si verifica uno dei sintomi sopraccitati.

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Neo Borocillina Sedativo Tosse può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza di tutti i singoli effetti elencati.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

- nausea, vomito, disturbi allo stomaco e/o intestinali,
- vertigini,
- sonnolenza,
- difficoltà a respirare,
- reazioni allergiche della pelle,
- riduzione dell'appetito,
- dipendenza psichica: sono stati riportati casi di uso eccessivo e dipendenza.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Neo Borocillina Sedativo Tosse**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non prenda questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Neo Borocillina Sedativo Tosse**

- Il principio attivo è destrometorfano bromidrato. 100 ml di soluzione contengono 3 g di destrometorfano bromidrato.
- Gli altri componenti sono: saccarina sodica, polivinilpirrolidone 25, etanolo, aroma balsamico, aroma vaniglia, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina Sedativo Tosse e contenuto della confezione**

Neo Borocillina Sedativo Tosse si presenta in forma di soluzione per gocce orali. Il contenuto della confezione è di un flacone da 10 ml.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore:  
Alfasigma S.p.A. - Via E. Fermi, n. 1 - 65020 Alanno (PE)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco

**FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Agenzia Italiana del Farmaco

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### Neo Borocillina Sedativo Tosse 30 mg/10 ml Sciroppo

Destrometorfano Bromidrato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Neo Borocillina Sedativo Tosse e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse
3. Come prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina Sedativo Tosse
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Neo Borocillina Sedativo Tosse e a cosa serve**

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene il principio attivo destrometorfano, che appartiene alla categoria dei farmaci sedativi (calmanti) della tosse.

Neo Borocillina Sedativo Tosse è usato come sedativo della tosse secca (calma la tosse).

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse**

##### **NON prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse:**

- se è allergico al destrometorfano o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha l'asma, la bronchite cronica (BPCO), la polmonite, difficoltà respiratorie o depressione respiratoria;
- se ha malattie cardiovascolari o soffre di pressione del sangue elevata;
- se soffre di ipertiroidismo (aumento di funzione della ghiandola tiroide);
- se ha il diabete;
- se soffre di aumento della pressione all'interno dell'occhio (glaucoma);
- se ha disturbi urinari causati dall'ingrossamento della prostata o da altre ostruzioni di organi genitali o delle vie urinarie;
- se ha ostruzioni dell'esofago, dello stomaco o dell'intestino;
- se ha gravi malattie del fegato;
- se soffre di epilessia;
- se sta prendendo farmaci antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi (IMAO) o se ha interrotto questo trattamento da meno di due settimane (vedere "Altri medicinali e Neo Borocillina Sedativo Tosse");
- se è in gravidanza, in particolare nel primo trimestre (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento");

- se sta allattando con latte materno (vedere il paragrafo “Gravidanza e allattamento”);
- se ha problemi ereditari di intolleranza ad alcuni zuccheri (per la presenza di saccarosio tra gli eccipienti; vedere il paragrafo “Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene saccarosio”);
- nei bambini di età inferiore a 2 anni.

### **Avvertenze e precauzioni**

Questo medicinale può portare a dipendenza. Pertanto il trattamento dovrà essere di breve durata.

Prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse con cautela e solo dopo aver consultato il medico:

- se presenta tosse irritante con una notevole produzione di muco (catarro);
- se presenta malattie del fegato; in caso di dubbio consulti il medico;
- se ha una storia di abuso di farmaci o sostanze psicoattive;
- se ha alcune particolari caratteristiche genetiche per le quali metabolizza lentamente questo medicinale.

È opportuno consultare il medico anche se tali disturbi si sono già presentati in passato.

### **Bambini**

Neo Borocillina Sedativo Tosse è controindicato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Usi Neo Borocillina Sedativo Tosse nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Altri medicinali e Neo Borocillina Sedativo Tosse**

Parli con il medico o il farmacista prima di assumere Neo Borocillina Sedativo Tosse.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare informi il medico se lei sta assumendo o ha recentemente assunto:

- medicinali appartenenti alla classe degli inibitori della monoaminoossidasi (MAO) (vedere paragrafo 2 “NON prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse”) come:
  - medicinali per il trattamento della malattia di Parkinson (per esempio selegilina o rasagilina)
  - medicinali antidepressivi o antipsicotici: (isocarboxazide, nialamide, fenelzina, tranilcipromina, iproniazide, iproclozide, moclobemide e toloxatone)

Neo Borocillina Sedativo Tosse può interagire con questi medicinali e si possono verificare alterazioni dello stato mentale (ad es. agitazione, allucinazioni, coma) e altri effetti come temperatura corporea superiore a 38°C, aumento frequenza cardiaca, disturbi della respirazione, pressione arteriosa instabile, esagerazione dei riflessi, rigidità muscolare, mancanza di coordinazione e/o sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea) anche quando il trattamento con questi farmaci è stato interrotto da meno di 2 settimane;

- medicinali per il trattamento dell’ansia o dell’insonnia (ipnotici, sedativi o ansiolitici), in quanto possono aumentare gli effetti del destrometorfano sul sistema nervoso centrale.
- i seguenti medicinali, in quanto possono aumentare i livelli di destrometorfano nel sangue inibendone il metabolismo:
  - medicinali per trattare la depressione come fluoxetina, paroxetina, sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2. “Non prenda Neo Borocillina Sedativo Tosse”);
  - medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza nei casi di dipendenza (metadone);
  - medicinali per trattare le malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina, perfenazina);
  - medicinali per trattare i disturbi del ritmo del cuore (amiodarone, chinidina, propafenone);
  - medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
  - medicinali per ridurre il livello di calcio nel sangue e trattare una disfunzione dell’organismo

- dovuta ad una ridotta secrezione dell'ormone che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;
- medicinali usati per impedire lo sviluppo dei funghi (miceti) (terbinafina).

L'uso concomitante di Neo Borocillina Sedativo Tosse e di medicinali sedativi quali benzodiazepine o medicinali correlati ad esse aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando altre opzioni di trattamento non sono possibili.

Tuttavia, se il medico le prescrive Neo Borocillina Sedativo Tosse insieme a medicinali sedativi, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere stabilite dal medico. Informi il medico riguardo a tutti i medicinali sedativi che sta prendendo e segua attentamente la raccomandazione del medico sulla dose. Può essere utile informare amici o parenti di prestare attenzione ai segni e sintomi sopra indicati. Si rivolga al medico qualora manifesti tali sintomi.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse con alcool**

Se sta prendendo Neo Borocillina Sedativo Tosse deve evitare l'uso di bevande alcoliche e di medicinali contenenti alcool: l'alcool aumenta l'effetto sedativo del destrometorfano con possibile riduzione del livello di attenzione (vedere il paragrafo "Guida di veicoli e utilizzo di macchinari").

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

Non usi Neo Borocillina Sedativo Tosse nel primo trimestre di gravidanza; nei mesi successivi usi il farmaco solo in caso di necessità, dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto beneficio / rischio nel proprio caso.

#### Allattamento

Non usi Neo Borocillina Sedativo Tosse durante l'allattamento poiché non è noto se il farmaco passa nel latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Neo Borocillina Sedativo Tosse può dare sonnolenza, che può influenzare la capacità di guidare veicoli e usare macchinari, specialmente in concomitanza con l'assunzione di alcool o di altri medicinali che possono rallentare i tempi di reazione.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene etanolo (alcool)**

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene 6 vol % di etanolo (alcool), equivalenti a 13 ml di birra o 5 ml di vino per dose da 10 ml.

Può essere dannoso negli alcolisti. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia.

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato**

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato, che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

### **Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene saccarosio**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Neo Borocillina Sedativo Tosse contiene 4 g di saccarosio per dose da 10 ml (1 cucchiaino). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

### **Per chi svolge attività sportiva**

La presenza di alcool etilico tra i componenti di questo medicinale può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

### **NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA**

La tosse secca è un sintomo che frequentemente accompagna le malattie da raffreddamento e gli stati influenzali; è dovuta allo stato infiammatorio delle vie respiratorie e non è accompagnata da produzione di muco e/o catarro. La tosse secca aumenta di frequenza e di intensità durante la notte, quando il paziente è sdraiato, infastidendo il sonno e peggiorando lo stato di infiammazione delle vie aeree.

La presenza di aria secca, la respirazione a bocca aperta e la posizione supina stimolano gli accessi di tosse. Per prevenire gli accessi è opportuno umidificare correttamente gli ambienti e favorire la respirazione nasale.

### **3. Come prendere Neo Borocillina Sedativo Tosse**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni: ½-1 cucchiaino, 3-4 volte al giorno.

Un cucchiaino corrisponde a 10 ml di sciroppo (30 mg di destrometorfano).

Non superare le dosi indicate.

Non prendere per più di 5-7 giorni.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **Uso nei bambini**

- Bambini dai 6 ai 12 anni: 1 cucchiaino, 2 volte al giorno.  
Un cucchiaino corrisponde a 5 ml di sciroppo (15 mg di destrometorfano).
- Bambini dai 2 ai 6 anni: utilizzare Neo Borocillina Sedativo Tosse in gocce.
- Nei bambini tra i 2 e i 12 anni di età Neo Borocillina Sedativo Tosse deve essere somministrato solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

#### **Se prende più Neo Borocillina Sedativo Tosse di quanto deve**

Popolazione pediatrica

Nei bambini in caso di sovradosaggio possono verificarsi eventi avversi gravi, inclusi disturbi neurologici. Le persone che si prendono cura dei pazienti non dovranno superare la dose raccomandata.

Se si assume più Neo Borocillina Tosse del dovuto, si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea e vomito, contrazioni muscolari involontarie, agitazione, confusione, senso di vertigini, sonnolenza, disturbi cognitivi, movimenti oculari involontari e rapidi, disturbi cardiaci (battito cardiaco accelerato), abbassamento della pressione del sangue, disturbi di coordinazione, psicosi con allucinazioni visive e ipereccitabilità.

Altri sintomi in caso di sovradosaggio massivo possono essere: impossibilità ad urinare, coma, gravi problemi respiratori e convulsioni.

Rivolgersi al medico o all'ospedale immediatamente se si verifica uno dei sintomi sopraccitati.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Neo Borocillina Sedativo Tosse può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza di tutti i singoli effetti elencati.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

- nausea, vomito, disturbi allo stomaco e/o intestinali,
- vertigini,
- sonnolenza,
- difficoltà a respirare,
- reazioni allergiche della pelle,
- riduzione dell'appetito,
- dipendenza psichica: sono stati riportati casi di uso eccessivo e dipendenza.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### 5. Come conservare Neo Borocillina Sedativo Tosse

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non prenda questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

#### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

##### Cosa contiene Neo Borocillina Sedativo Tosse

- Il principio attivo è destrometorfano bromidrato. 100 ml di sciroppo contengono 300 mg di destrometorfano bromidrato.
- Gli altri componenti sono: saccarosio, glicerolo, etanolo, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma arancia, acqua depurata.

##### Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina Sedativo Tosse e contenuto della confezione

Neo Borocillina Sedativo Tosse si presenta in forma di sciroppo.

La confezione contiene un flacone di vetro da 100 ml.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:  
Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore:  
Alfasigma S.p.A. - Via E. Fermi, n. 1 - 65020 Alanno (PE)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco