

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Lovoldyl Lassativo 5 mg compresse rivestite

Bisacodile

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lovoldyl Lassativo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lovoldyl Lassativo
3. Come usare Lovoldyl Lassativo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lovoldyl Lassativo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lovoldyl Lassativo e a cosa serve

Lovoldyl Lassativo contiene il principio attivo bisacodile.

Lovoldyl Lassativo è un farmaco che appartiene alla classe dei lassativi di contatto che agiscono per contatto diretto con la parete interna dell'intestino aumentando le contrazioni muscolari e accelerando il transito del contenuto nell'intestino.

Lovoldyl Lassativo è indicato per un trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

2. Cosa deve sapere prima di usare Lovoldyl Lassativo

NON usi Lovoldyl Lassativo

- se è allergico al bisacodile o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
 - in caso di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito
 - in caso di blocco intestinale causato da forme occlusive o restrittive (ostruzione o stenosi intestinale)
 - in caso di blocco o rallentamento del cibo nel tratto intestinale (ileo paralitico)
 - in caso di sanguinamento rettale di origine sconosciuta
 - in caso di dolore addominale acuto di emergenza chirurgica (addome chirurgico acuto)
 - in caso di grave stato di disidratazione
 - in caso di malattie infiammatorie intestinali in fase attiva
- se presenta disturbi dello stomaco e dell'intestino (gastroenterite) o appendicite
- in bambini di età inferiore a 2 anni
- in gravidanza e allattamento (vedere paragrafo "Gravidanza, allattamento e fertilità").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lovoldyl Lassativo.

Consulti il medico:

- se la necessità di prendere un lassativo deriva da un inaspettato cambiamento delle consuete abitudini intestinali (frequenza e caratteristiche delle evacuazioni), che si protrae da più di 2 settimane
- in caso di sanguinamento rettale
- se l'uso del lassativo non ha prodotto benefici
- se ha elevati livelli di zuccheri nel sangue (diabete mellito), se soffre di pressione alta (ipertensione) o di malattie al cuore (cardiache)
- se è un paziente anziano o in cattive condizioni di salute
- in caso di malattie infiammatorie dell'intestino
- in caso di dolore addominale, nausea e vomito
- in tutte le fasi del trattamento (diagnosi, prescrizione dei farmaci e controllo continuo durante tutto il corso della terapia) se deve curare la stitichezza cronica e ricorrente.

Tenga sempre presente che un uso frequente o prolungato dei lassativi può determinare diarrea persistente con perdita di acqua e sali minerali (specialmente potassio). Nei casi più gravi possono manifestarsi disidratazione e perdita di potassio (ipopotassiemia) e di altri fattori nutritivi essenziali, che possono determinare l'insorgenza di alterazioni al cuore e neuromuscolari, soprattutto in concomitanza di terapie con farmaci che favoriscono l'eliminazione di acqua (diuretici), che agiscono sulla contrazione del cuore (digitalici) o di farmaci cortisonici (corticosteroidi).

Si ricordi che l'uso eccessivo di Lovoldyl Lassativo può essere causa di:

- dipendenza (necessità di aumentare progressivamente il dosaggio per ottenere gli stessi effetti)
- stitichezza cronica
- perdita delle normali funzioni dell'intestino (atonía intestinale) e stitichezza cronica.

Se è un paziente anziano o presenta insufficienza renale, la disidratazione può costituire motivo di pericolo per la sua salute. I sintomi della disidratazione si manifestano con sete e scarsa produzione di urina (oliguria). In questo caso sospenda il trattamento con Lovoldyl Lassativo e lo riprenda solo sotto controllo di un medico.

Deve sapere che si sono verificati alcuni casi di vertigini o di perdita di coscienza (sincope) in seguito all'assunzione di preparati a base di bisacodile che però non sono riconducibili alla somministrazione del medicinale ma causati dagli sforzi per la defecazione.

Bambini

Usi Lovoldyl Lassativo solo sotto stretto controllo di un medico in bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni con disturbi di stitichezza cronica.

Altri medicinali e Lovoldyl Lassativo

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale.

Lasci trascorrere un intervallo di almeno 2 ore dall'assunzione di altri medicinali, prima di prendere Lovoldyl Lassativo, perché i lassativi riducono il tempo di permanenza nell'intestino influenzando sul loro assorbimento. Se utilizza il lassativo in concomitanza a medicinali che aumentano la produzione di urina (diuretici) e a base di cortisone (corticosteroidi) può aumentare il rischio di squilibrio dei sali del corpo (squilibrio elettrolitico) che comporta a sua volta un aumento della sensibilità ai medicinali per il cuore (glicosidi cardioattivi).

Usi Lovoldyl Lassativo almeno un'ora dopo aver preso dei medicinali antiacidi poiché possono modificarne l'effetto.

Lovoldyl Lassativo con cibi e bevande

Usi Lovodyl Lassativo almeno un'ora dopo aver consumato latte e i suoi derivati perché possono modificare l'effetto del lassativo.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non sono stati condotti studi volti ad indagare gli effetti sulla fertilità umana.

Non esistono studi adeguati sull'uso del bisacodile in gravidanza. Dati clinici dimostrano che la forma attiva del bisacodile e i suoi derivati non passano nel latte materno.

Tuttavia, durante la gravidanza o allattamento, usi Lovodyl Lassativo solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Il medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Eviti di guidare veicoli se avverte sensazioni di vertigini.

Lovodyl Lassativo contiene lattosio e saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come usare Lovodyl Lassativo

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

1-2 compresse al giorno prima di andare a letto.

Uso nei bambini e negli adolescenti

nei bambini tra 2 e 10 anni: 1 compressa al giorno prima di andare a letto sotto il diretto controllo del medico.

nei bambini al di sopra dei 10 anni e adolescenti: 1-2 compresse al giorno prima di andare a letto. Non usare nei bambini di età uguale o inferiore ai 2 anni.

Utilizzi le compresse di Lovodyl Lassativo:

- intere, senza masticare, con un abbondante bicchiere d'acqua.
- almeno 1 ora dopo l'assunzione di latte e di medicinali antiacidi.
- almeno 2 ore dopo l'assunzione di altri medicinali per via orale.
- dopo cena in modo che l'effetto lassativo, che si produce dopo 10 -12 ore, non disturbi il sonno.

Inizi ad usare una dose minima del medicinale, sufficiente a ottenere una facile evacuazione di feci molli. In caso non riesca a ottenere i benefici attesi, aumenti la dose, ma non deve superare quella massima indicata, senza il consiglio del medico.

Non utilizzi Lovodyl Lassativo per più di sette giorni. In caso di necessità di impiego per periodi più prolungati si rivolga al medico o al farmacista.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se usa più Lovodyl Lassativo di quanto deve

Avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale se ha assunto una dose eccessiva di Lovodyl Lassativo o se ha involontariamente ingerito il medicinale. Porti con sé questo foglio illustrativo.

Dosi troppo elevate del medicinale possono essere causa di dolori addominali e diarrea con conseguente perdita di liquidi e sali minerali che devono essere reintegrati.

I lassativi, assunti in sovradosaggio cronico, possono causare diarrea cronica, dolori addominali, perdita di potassio (ipopotassiemia), aumentata produzione di un ormone chiamato aldosterone (iperaldosteronismo secondario) e calcoli renali. In associazione all'uso cronico di lassativi sono stati descritti: danno renale, alterazione del pH del sangue (alcalosi metabolica) e debolezza muscolare secondaria all'ipopotassiemia.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- crampi addominali
- nausea
- dolore addominale
- diarrea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- vertigini
- presenza di sangue nelle feci (ematochezia)
- vomito
- malessere addominale
- fastidio al retto e all'ano

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- infiammazione del colon (colite)
- reazioni allergiche gravi (reazioni anafilattiche)
- rapido gonfiore della cute (angioedema)
- reazioni di ipersensibilità
- disidratazione

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lovoldyl Lassativo

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Conservi la scatola e il relativo foglio illustrativo per avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lovoldyl Lassativo

Una compressa rivestita contiene:

- Il principio attivo è bisacodile 5 mg.
- Gli altri componenti del medicinale sono: lattosio, amido di mais, saccarosio, talco, gliceril beenato, magnesio carbonato, copolimeri metacrilici, PEG 4000, titanio diossido.

Descrizione dell'aspetto di Lovoldyl Lassativo e contenuto della confezione

Lovoldyl Lassativo si presenta in confezione da 30 compresse in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano (MI)

Produttore

Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A.

Via Follereau, 25

24027 Nembro (BG)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a Agosto 2017

Nota di educazione sanitaria

Tenga presente che, nella maggior parte dei casi, una dieta bilanciata e ricca di acqua e fibre (crusca, verdure e frutta) può risolvere in modo duraturo il problema della stitichezza. Ricordi che è una convinzione sbagliata pensare che se non si riesce a evacuare ogni giorno si soffre di stitichezza: questa situazione è invece del tutto normale per un gran numero di persone.

Consideri che soffre di stitichezza se le evacuazioni sono ridotte rispetto alle proprie personali abitudini e se sono associate all'emissione di feci dure. Se gli episodi di stitichezza si presentano ripetutamente deve essere consultato il medico.