

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

**XANAX 0,25 mg compresse**  
**XANAX 0,50 mg compresse**  
**XANAX 1 mg compresse**  
**XANAX 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione**

Alprazolam

### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Xanax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Xanax
3. Come prendere Xanax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Xanax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Che cos'è Xanax e a cosa serve**

Xanax contiene il principio attivo alprazolam. L'alprazolam appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati benzodiazepine ed agisce riducendo l'ansia, facilitando il sonno, diminuendo l'agitazione e lo squilibrio emotivo (effetto sedativo).

Xanax è utilizzato per il trattamento delle seguenti condizioni quando sono gravi e causano disagio nella normale vita quotidiana:

- **ansia**
- **attacchi di panico** associati o meno a paura/disagio a frequentare ampi spazi all'aperto (agorafobia).

### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Xanax**

#### **Non prenda Xanax**

- se è **allergico** ad alprazolam, alle benzodiazepine o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha la **miastenia gravis**, una malattia che provoca grave debolezza muscolare;
- se ha **gravi problemi di respirazione** (insufficienza respiratoria);
- se ha **gravi problemi al fegato** (insufficienza epatica);
- se ha problemi a respirare durante il sonno (**apnea notturna**);

- se soffre di una malattia dell'occhio chiamata **glaucoma** acuto ad angolo chiuso, un problema causato dall'aumento della pressione all'interno degli occhi;
- nei primi 3 mesi di **gravidanza** e se sta **allattando al seno** (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento").

### **Avvertenze e precauzioni**

Questo medicinale può ridurre fino ad annullare lo stato di coscienza, può provocare una notevole riduzione della capacità spontanea di respirare, il coma e la morte qualora venga assunto assieme ad altri medicinali che agiscono sul cervello e sulla mente (ad esempio oppioidi, antipsicotici e ipnotici-sedativi) (paragrafo Altri medicinali e Xanax).

Si rivolga al medico o al farmacista **prima** di prendere Xanax se:

- è **anziano** e/o **debolito**. Il medico le prescriverà una dose ridotta di questo medicinale; si ricordi di usare questo medicinale con cautela perché può causarle sedazione e/o debolezza muscoloscheletrica ed esporla a cadute, spesso con gravi conseguenze;
- ha **problemi cronici di respirazione** (insufficienza respiratoria cronica), perché questo medicinale può peggiorare la sua condizione;
- ha **problemi ai reni** (insufficienza renale) oppure **problemi al fegato** di grado lieve o moderato (insufficienza epatica da lieve a moderata);
- soffre di **depressione grave**. Xanax, come le altre benzodiazepine, non deve essere usato da solo per trattare la depressione o l'ansia connessa con la depressione perché può peggiorare la tendenza al suicidio e provocare modificazioni dell'umore;
- soffre di **psicosi**, una grave malattia mentale che altera il comportamento e causa difficoltà a rapportarsi con le altre persone. Xanax non è consigliato come trattamento principale di questa condizione;
- è in trattamento con altri **medicinali** che agiscono sul cervello e sulla mente, perché Xanax può aumentare gli effetti di questi medicinali (vedere paragrafo "Altri medicinali e Xanax");
- ha o ha avuto in passato problemi di abuso e **dipendenza** da alcol, droga o altri medicinali, perché è maggiore il rischio di sviluppare dipendenza da Xanax (vedere paragrafo "Sviluppo di dipendenza");
- soffre di problemi ereditari rari di intolleranza ad un particolare zucchero (galattosio).

### Disturbi della memoria

Alcune ore dopo l'assunzione di Xanax, lei potrebbe avere difficoltà a ricordare ciò che è accaduto **dopo** l'assunzione del medicinale.

### Disturbi paradossi

Xanax può causare effetti opposti rispetto a quelli previsti (**effetti paradossi**) (vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati"). Questi effetti sono più frequenti nei bambini e nelle persone anziane.

Se manifesta questi effetti, si rivolga al medico perché il trattamento con Xanax deve essere interrotto.

### Sviluppo di tolleranza

Dopo alcune settimane di trattamento potrebbe verificarsi una diminuzione dell'efficacia di Xanax.

### Sviluppo di dipendenza

Xanax causa **dipendenza** (cioè lei può manifestare crescente desiderio di voler assumere il medicinale o può sviluppare disturbi fisici che diminuiscono o scompaiono solo dopo aver assunto il medicinale). La probabilità che si sviluppi

dipendenza aumenta con l'aumentare della dose e della durata del trattamento. Pertanto, il medico le prescriverà la cura più adeguata in base ai suoi disturbi ed alle sue condizioni, usando la dose efficace più bassa possibile da assumere per il periodo più breve possibile. Il medico le indicherà anche quando sottoporsi a delle visite di controllo per valutare l'andamento della sua salute in relazione alla terapia con Xanax.

#### Assunzione non corretta di Xanax

Lei deve assumere questo medicinale **SOLO** se prescritto dal medico e dopo averlo acquistato in farmacia. Alcune persone hanno la tendenza a fare abuso di Xanax e di altri medicinali simili, chiamati benzodiazepine.

Inoltre, alcune persone si procurano tali medicinali in maniera illecita (es. mercato nero, internet, amici, familiari, etc), talora allo scopo di rivenderlo ad altri. **NON** assuma Xanax se questo medicinale non le è stato prescritto dal medico. **NON** assuma Xanax se lei non è sicuro che questo medicinale è stato acquistato presso una farmacia.

#### **Bambini e adolescenti**

Non è nota l'efficacia e la sicurezza di Xanax nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Il medico deciderà se Xanax può essere somministrato ai bambini e agli adolescenti in base alle loro condizioni.

#### **Altri medicinali e Xanax**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'uso concomitante di Xanax e oppioidi (forti antidolorifici, medicinali per terapia sostitutiva e alcuni farmaci per la tosse) aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita.

Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento.

Tuttavia, se il medico prescrive Xanax insieme agli oppioidi, la dose e la durata della terapia concomitante devono essere limitati dal medico.

Informi il medico circa tutti i medicinali oppioidi che sta assumendo e segua attentamente le raccomandazioni del medico sul dosaggio. Potrebbe essere utile informare amici o parenti per renderli consapevoli dei segni e sintomi sopra indicati. Contatti il medico nel caso in cui si verificano tali sintomi.

È necessaria cautela quando Xanax viene preso insieme ai seguenti medicinali:

- **medicinali** che agiscono sul **cervello** e sulla **mente\*** quali:
  - **antipsicotici**, medicinali per il trattamento di alcune malattie mentali;
  - **ipnotici**, stimolanti il sonno;
  - **sedativi**, tranquillanti;
  - **ansiolitici**, medicinali per il trattamento dell'ansia;
  - **antidepressivi** (es. nefazodone, fluvoxamina, fluoxetina, imipramina e desipramina), medicinali per il trattamento della depressione;
  - **analgesici narcotici, oppioidi**, medicinali per il trattamento del dolore di elevata intensità;
  - **antiepilettici**, medicinali per il trattamento degli attacchi epilettici;
  - **anestetici**. Gli anestetici, somministrati insieme a Xanax, possono causare euforia con aumento della probabilità di sviluppare dipendenza da Xanax;
  - **antistaminici sedativi**, medicinali per contrastare le manifestazioni allergiche;

\* Se lei assume **Xanax** assieme a uno o più di questi medicinali oppure insieme a bevande alcoliche, queste sostanze possono contribuire a diminuire le funzioni del suo cervello e della sua mente fino a causare la riduzione della capacità spontanea di respirare, il coma e la morte (paragrafo **Avvertenze e precauzioni**).

- **analgesici e sedativi della tosse**, a base di oppio e dei suoi derivati. Questi medicinali, come Xanax, riducono la capacità spontanea di respirare;
- **cimetidina**, un medicinale usato per diminuire l'acidità dello stomaco;
- **propossifene**, un medicinale usato contro il dolore;
- **contraccettivi orali**;
- **diltiazem**, un medicinale usato per ridurre la pressione del sangue;
- **digossina** (un medicinale usato per aumentare la forza di contrazione del cuore). Se lei è anziano, l'assunzione di Xanax può aumentare la probabilità di sviluppare gli effetti tossici dovuti a digossina.

I seguenti medicinali possono aumentare gli effetti di Xanax:

- **ketoconazolo, itraconazolo, posaconazolo e voriconazolo**, medicinali per il trattamento di infezioni causate da funghi;
- **eritromicina, claritromicina, telitromicina e troleandromicina** (antibiotici);
- **inibitori delle proteasi** (es. **ritonavir**), medicinali per il trattamento dell'infezione da virus HIV. Se lei è in trattamento con gli inibitori delle proteasi, il medico potrebbe consigliarle anche di interrompere il trattamento con Xanax a causa dell'interazione con questi medicinali.

### **Xanax con alcol**

**Non** beva alcol durante l'assunzione di Xanax perché l'alcol aumenta gli effetti di questo medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

**Questo medicinale non deve essere preso nei primi 3 mesi di gravidanza** perché può causare malformazioni congenite nel feto. Il medico valuterà se lei può assumere questo medicinale durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza.

Se lei assume questo medicinale negli **ultimi mesi di gravidanza** oppure durante il **travaglio**, il neonato può manifestare i seguenti sintomi:

- scarso tono dei muscoli (ipotonia assiale);
- difficoltà a respirare (depressione respiratoria o apnea) e ad assumere il latte;
- bassa temperatura corporea (ipotermia);
- sintomi di astinenza (vedere paragrafo 3 “Se interrompe il trattamento con Xanax”).

Questi effetti sono reversibili e possono durare da alcuni giorni fino a 1-3 settimane dopo la nascita del bambino.

#### Allattamento

**Non** allatti al seno durante l'assunzione di Xanax perché questo medicinale passa nel latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

**Non** guidi né utilizzi macchinari se durante il trattamento con Xanax manifesta perdita della concentrazione o del controllo dei muscoli o se si sente assonnato o stordito. Questi effetti possono essere aumentati se non ha dormito a sufficienza o se ha assunto bevande alcoliche.

#### **Xanax compresse contiene lattosio**

Le compresse da 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg di Xanax contengono lattosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

#### **Xanax compresse contiene sodio benzoato**

Le compresse da 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg di Xanax contengono 0,11 mg di sodio benzoato per dose.

#### **Xanax 0,50 mg compresse contiene giallo tramonto**

Le compresse di Xanax da 0,50 mg contengono il colorante giallo tramonto che può causare reazioni allergiche.

#### **Xanax 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione contiene etanolo**

Questo medicinale contiene fino al 16% vol di etanolo (alcol), ad es. fino a 173 mg per dose, equivalenti a 4 ml di birra e 2 ml di vino per dose. Può essere dannoso per gli alcolisti.

Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o epilessia.

#### **Xanax 0,75 mg/ml gocce orali, soluzione contiene propilene glicole**

Questo medicinale contiene 933 mg di propilene glicole per dose.

Se il bambino ha meno di 5 anni di età, parli con il medico o il farmacista prima di somministrare questo medicinale, in particolare se il bambino sta assumendo altri medicinali contenenti propilene glicole o alcol.

Se lei è in gravidanza o sta allattando, non prenda questo medicinale se non diversamente raccomandato dal medico. Il medico potrà fare ulteriori controlli durante la terapia.

Se lei soffre di malattie al fegato o ai reni, non prenda questo medicinale se non diversamente raccomandato dal medico. Il medico potrà fare ulteriori controlli durante la terapia.

### **3. Come prendere Xanax**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico.

#### **• Trattamento dell'ansia**

La dose raccomandata iniziale è da 0,25 mg a 0,5 mg 3 volte al giorno.

Se lei preferisce la formulazione in **gocce**, la dose iniziale raccomandata è da 10 a 20 gocce 3 volte al giorno.

La dose può essere aumentata gradualmente, fino ad un massimo di 4 mg al giorno, da suddividere in diverse dosi. Lei deve aumentare prima la dose da prendere la sera e successivamente la dose da prendere durante il giorno.

Se è anziano, ha problemi al fegato o ai reni e/o è debilitato

La dose iniziale raccomandata è 0,25 mg (corrispondente a 10 gocce) 2-3 volte al giorno.

#### **• Trattamento degli attacchi di panico**

La dose iniziale raccomandata è da 0,5 mg a 1 mg da prendere per 1-2 giorni **appena prima** di andare a letto.


In seguito la dose può essere aumentata gradualmente di 1 mg ogni 3 o 4 giorni. Lei deve aumentare prima la dose che prende a mezzogiorno, poi la dose del mattino e infine la dose da assumere nel pomeriggio o sera, fino ad assumere Xanax 3 o 4 volte al giorno.

### **La durata del trattamento con Xanax deve essere la più breve possibile.**

La durata consigliata di terapia non dovrebbe superare 8-12 settimane per il trattamento dell'ansia e 8 mesi per il trattamento degli attacchi di panico. Questo periodo comprende anche il tempo necessario per ridurre gradualmente la dose di Xanax fino alla sospensione. Il medico deciderà se il trattamento può essere continuato oltre il periodo massimo consigliato.

### **Istruzioni per l'apertura del flacone delle gocce**

- Premere sul tappo di plastica e contemporaneamente svitare



- Per chiudere avvitare il tappo fino in fondo

### **Se prende più Xanax di quanto deve**

Se ha preso una dose eccessiva di Xanax contatti immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso più vicino.

- Nei casi lievi i sintomi possono essere: confusione mentale, sonnolenza, difficoltà nel parlare.
- Nei casi più gravi, i sintomi possono essere: perdita della capacità di coordinare i movimenti, scarso tono muscolare, bassa pressione del sangue, problemi di respirazione, coma, morte.

### **Se dimentica di prendere Xanax**

Se dimentica di prendere una dose, la prenda appena se ne ricorda a meno che non sia quasi ora di assumere la dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Xanax**

**Non** interrompa l'assunzione di Xanax improvvisamente. Consulti sempre il medico prima di interrompere l'assunzione di Xanax. Lei deve ridurre le dosi gradualmente per evitare di manifestare:

- **sintomi di astinenza** quali:
  - sintomi gravi: sensazione di distacco da se stessi o dal mondo esterno, intorpidimento e formicolio delle gambe o delle braccia, aumento della sensibilità alla luce, ai suoni e al contatto fisico, allucinazioni, attacchi epilettici, crampi muscolari e addominali, vomito, sudorazione, tremori, convulsioni;
  - altri sintomi: mal di testa, dolori muscolari, ansia, tensione, irrequietezza, confusione, irritabilità, lieve depressione dell'umore, insonnia;
- **sintomi di rimbalzo**, per es. attacchi di panico e ansia. Questi sintomi sono gli stessi per i quali le è stato consigliato il trattamento con Xanax e possono

ripresentarsi temporaneamente in modo più intenso dopo interruzione brusca del trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si rivolga **immediatamente** al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati perché l'assunzione di Xanax deve essere **interrotta**:

- effetti opposti rispetto a quelli previsti (**effetti paradossi**) (vedere paragrafo 2 "Disturbi paradossi") quali:
  - irrequietezza
  - agitazione
  - irritabilità
  - aggressività
  - sensazione di delusione
  - collera
  - incubi
  - allucinazioni
  - disturbi del pensiero
  - alterazioni del comportamento

Si rivolga **immediatamente** al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati perché possono essere **gravi**:

- gonfiore del viso, della lingua e della gola con conseguente incapacità a deglutire e a respirare (**angioedema**)
- **difficoltà a ricordare** ciò che è accaduto dopo l'assunzione del medicinale (vedere paragrafo 2 "Disturbi della memoria")
- smascheramento di una **depressione** già esistente
- **dipendenza** (vedere paragrafo 2 "Sviluppo di dipendenza")
- **sintomi di astinenza** e **sintomi di rimbalzo** (vedere paragrafo 3 "Se interrompe il trattamento con Xanax")

Si rivolga al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:

**Molto comune** (possono interessare più di 1 persona su 10):

- depressione
- sedazione
- sonnolenza
- perdita della capacità di coordinare i movimenti
- disturbi della memoria
- difficoltà nel parlare
- capogiri
- mal di testa
- stitichezza
- bocca asciutta per mancanza di saliva
- affaticamento
- irritabilità

**Comune** (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- diminuzione dell'appetito, diminuzione o aumento del peso corporeo
- confusione, disorientamento
- aumento o diminuzione del desiderio sessuale, disfunzioni sessuali
- ansia
- insonnia, sonno eccessivo
- nervosismo
- disturbi dell'equilibrio, problemi nella coordinazione dei movimenti
- perdita di attenzione e concentrazione
- eccessiva sonnolenza (letargia)
- tremori
- vertigini
- parlare in maniera stentata (biassicamento)
- offuscamento della vista
- nausea
- dermatiti
- irritabilità

**Non comune** (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- idee e comportamenti ossessivi
- incapacità di ricordare eventi della vita recente
- vomito
- debolezza muscolare
- incontinenza
- ciclo mestruale irregolare
- dipendenza da farmaco
- sindrome da astinenza da farmaco

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- aumento dei livelli di prolattina (un ormone naturale) nel sangue
- cambiamenti di umore
- comportamenti ostili, pensieri anomali
- impulsività e iperattività motoria
- alterazioni del sistema nervoso responsabile delle funzioni dell'organismo che non possono essere controllate volontariamente (es. le funzioni degli organi interni e delle ghiandole)
- contrazione involontaria dei muscoli che costringono ad assumere posizioni innaturali
- malattie dello stomaco e dell'intestino
- malattie infiammatorie del fegato (epatiti)
- alterazione del funzionamento del fegato
- colorazione gialla/giallastra della pelle e delle mucose (ittero)
- reazioni a livello della pelle dovute all'esposizione al sole
- incapacità di svuotare completamente la vescica
- gonfiore delle mani e dei piedi dovuto ad accumulo di liquidi
- aumento della pressione all'interno dell'occhio
- abuso di questo medicinale (tendenza a un uso eccessivo o non corretto di Xanax)

## **Segnalazione degli effetti indesiderati**



Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare Xanax

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sul blister e sul flacone dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

### Compresse

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

### Gocce

Validità dopo prima apertura: 90 giorni. Lei può annotare la data di prima apertura nell'apposito spazio sull'astuccio.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **Cosa contiene Xanax**

Il principio attivo è alprazolam.

### Compresse

Una compressa di Xanax da 0,25 mg contiene 0,25 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **lattosio** monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, **sodio benzoato**, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Una compressa di Xanax da 0,5 mg contiene 0,5 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **lattosio** monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, **sodio benzoato**, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, **giallo tramonto** (E110) lacca di alluminio.

Una compressa di Xanax da 1 mg contiene 1 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **lattosio** monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, **sodio benzoato**, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio.

### Gocce

1 ml di Xanax gocce orali, soluzione contiene 0,75 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **alcol**, **glicole propilenico**, saccarinato di sodio, aroma pompelmo, acqua depurata.

## **Descrizione dell'aspetto di Xanax e contenuto delle confezioni**

Le compresse di Xanax da 0,25 mg sono compresse ovali di colore bianco con una linea di incisione su un lato e con "Upjohn 29" sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Le compresse di Xanax da 0,5 mg sono compresse ovali di colore arancione chiaro con una linea di incisione su un lato e con "Upjohn 55" sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Le compresse di Xanax da 1 mg sono compresse ovali di colore blu con una linea di incisione su un lato e con "Upjohn 90" sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Xanax gocce orali soluzione è una soluzione limpida di colore giallo-oro. Le gocce orali sono disponibili in flacone di vetro da 20 ml con tappo e contagocce in politene.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore  
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.  
Via Isonzo, 71  
04100 Latina

**Produttore**

Compresse

Pfizer Italia S.r.l.  
Località Marino del Tronto  
63100 Ascoli Piceno (AP)

Gocce orali, soluzione

Delpharm Orléans 5 Avenue de Concyr  
45071 Orleans Cedex 2  
Francia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**

**XANAX 0,5 mg compresse a rilascio prolungato  
XANAX 1 mg compresse a rilascio prolungato  
XANAX 2 mg compresse a rilascio prolungato  
XANAX 3 mg compresse a rilascio prolungato**

alprazolam

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.

- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

7. Che cos'è Xanax e a cosa serve
8. Cosa deve sapere prima di prendere Xanax
9. Come prendere Xanax
10. Possibili effetti indesiderati
11. Come conservare Xanax
12. Contenuto della confezione e altre informazioni

## **1. Che cos'è Xanax e a cosa serve**

Xanax contiene il principio attivo alprazolam. L'alprazolam appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati benzodiazepine ed agisce riducendo l'attività del sistema nervoso centrale. Questo medicinale è assorbito lentamente dopo essere stato assunto per bocca, per fare in modo che il suo effetto continui per molte ore.

Xanax è utilizzato per il trattamento della seguente condizione quando è grave e causa disagio nella normale vita quotidiana:

- **attacchi di panico** associati o meno a paura/disagio a frequentare ampi spazi all'aperto (agorafobia).

## **2. Cosa deve sapere prima di prendere Xanax**

### **Non prenda Xanax:**

- se è **allergico** ad alprazolam, alle benzodiazepine o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di una malattia dell'occhio chiamata **glaucoma** acuto ad angolo chiuso, un problema causato dall'aumento della pressione all'interno degli occhi;
- se ha **gravi problemi di respirazione** (insufficienza respiratoria);
- se ha **gravi problemi al fegato** (insufficienza epatica);
- se ha la **miastenia gravis**, una malattia che provoca grave debolezza muscolare;
- se ha problemi a respirare durante il sonno (**apnea notturna**);
- nei primi 3 mesi di **gravidanza** e se sta **allattando al seno** (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento").

### **Avvertenze e precauzioni**

Questo medicinale può ridurre fino ad annullare lo stato di coscienza, può provocare una notevole riduzione della capacità spontanea di respirare, il coma e la morte qualora venga assunto assieme ad altri medicinali che agiscono sul cervello e sulla mente (ad esempio oppioidi, antipsicotici e ipnotici-sedativi) (paragrafo Altri medicinali e Xanax).

Si rivolga al medico o al farmacista **prima** di prendere Xanax se:

- è **anziano** e/o **debolito**. Il medico le prescriverà una dose ridotta di questo medicinale; si ricordi di usare questo medicinale con cautela perché può

causarle sedazione e/o debolezza muscoloscheletrica ed esporla a cadute, spesso con gravi conseguenze;

- ha **problemi ai reni** (insufficienza renale) oppure **problemi al fegato** di grado lieve o moderato (insufficienza epatica da lieve a moderata);
- ha **problemi cronici di respirazione** (insufficienza respiratoria cronica), perché questo medicinale può peggiorare la sua condizione;
- ha o ha avuto in passato problemi di abuso e **dipendenza** da alcol, droga o altri medicinali, perché è maggiore il rischio di sviluppare dipendenza da Xanax (vedere paragrafo “Sviluppo di dipendenza”);
- soffre di **depressione grave**. Xanax, come le altre benzodiazepine, non deve essere usato da solo per trattare la depressione o l’ansia connessa con la depressione perché può peggiorare la tendenza al suicidio e provocare modificazioni dell’umore;
- è in trattamento con **ketoconazolo, itraconazolo** o altri medicinali simili (vedere paragrafo “Altri medicinali e Xanax”);
- è in trattamento con altri **medicinali** che agiscono sul cervello e sulla mente, perché Xanax può aumentare gli effetti di questi medicinali (vedere paragrafo “Altri medicinali e Xanax”);
- soffre di **psicosi**, una grave malattia mentale che altera il suo comportamento e le causa difficoltà a rapportarsi con le altre persone. Xanax non è consigliato come trattamento principale di questa condizione;
- soffre di **difficoltà a coordinare i movimenti**;
- soffre di problemi ereditari rari di intolleranza ad un particolare zucchero (galattosio).

#### Disturbi della memoria

Parecchie ore dopo l’assunzione di Xanax, lei potrebbe avere difficoltà a ricordare ciò che è accaduto **dopo** l’assunzione del medicinale.

#### Disturbi paradossi

Xanax può causare effetti opposti rispetto a quelli previsti (**effetti paradossi**) (vedere paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”). Questi effetti sono più frequenti nei bambini e nelle persone anziane.

Se manifesta questi effetti, si rivolga al medico perché il trattamento con Xanax deve essere interrotto.

#### Sviluppo di tolleranza

Dopo alcune settimane di trattamento potrebbe verificarsi una diminuzione dell’efficacia di Xanax.

#### Sviluppo di dipendenza

Xanax causa **dipendenza** (cioè lei può manifestare crescente desiderio di voler assumere il medicinale o può sviluppare disturbi fisici che diminuiscono o scompaiono solo dopo aver assunto il medicinale).

La probabilità che si sviluppi dipendenza aumenta con l’aumentare della dose e della durata del trattamento. Pertanto, il medico le prescriverà la cura più adeguata in base ai suoi disturbi ed alle sue condizioni, usando la dose efficace più bassa possibile da assumere per il periodo più breve possibile. Il medico le indicherà anche quando sottoporsi a delle visite di controllo per valutare l’andamento della sua salute in relazione alla terapia con Xanax.

#### Assunzione non corretta di Xanax

Lei deve assumere questo medicinale **SOLO** se prescritto dal medico e dopo averlo acquistato in farmacia. Alcune persone hanno la tendenza a fare abuso di Xanax e di altri medicinali simili, chiamati benzodiazepine. Inoltre, alcune persone si procurano tali medicinali in maniera illecita (es. mercato nero, internet, amici, familiari, etc), talora allo scopo di rivenderlo ad altri. **NON** assuma Xanax se questo medicinale non le è stato prescritto dal medico. **NON** assuma Xanax se lei non è sicuro che questo medicinale è stato acquistato presso una farmacia.

### **Bambini e adolescenti**

Non è nota l'efficacia e la sicurezza di Xanax nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Il medico deciderà se Xanax può essere somministrato ai bambini e agli adolescenti in base alle loro condizioni.

### **Altri medicinali e Xanax**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

L'uso concomitante di Xanax e oppioidi (forti antidolorifici, medicinali per terapia sostitutiva e alcuni farmaci per la tosse) aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà nella respirazione (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita.

Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento.

Tuttavia, se il medico prescrive Xanax insieme agli oppioidi, la dose e la durata della terapia concomitante devono essere limitati dal medico.

Informi il medico circa tutti i medicinali oppioidi che sta assumendo e segua attentamente le raccomandazioni del medico sul dosaggio. Potrebbe essere utile informare amici o parenti per renderli consapevoli dei segni e sintomi sopra indicati. Contatti il medico nel caso in cui si verificano tali sintomi.

La somministrazione dei seguenti medicinali insieme a Xanax non è raccomandata:

- **ketoconazolo, itraconazolo, posaconazolo e voriconazolo**, medicinali per il trattamento di infezioni causate da funghi;
- **diltiazem**, un medicinale usato per ridurre la pressione del sangue.

È necessaria cautela quando Xanax viene preso insieme ai seguenti medicinali:

- **medicinali** che agiscono sul **cervello** e sulla **mente\***, quali:
  - **antipsicotici**, medicinali per il trattamento di alcune malattie mentali
  - **ipnotici**, stimolanti il sonno
  - **sedativi**, tranquillanti
  - **ansiolitici**, medicinali per il trattamento dell'ansia
  - **antidepressivi** (es. nefazodone, fluvoxamina, fluoxetina, imipramina e desipramina), medicinali per il trattamento della depressione
  - **analgesici narcotici, oppioidi**, medicinali per il trattamento del dolore di elevata intensità
  - **antiepilettici** (es. carbamazepina), medicinali per il trattamento degli attacchi epilettici
  - **anestetici**. Gli anestetici, somministrati insieme a Xanax, possono causare euforia con aumento della probabilità di sviluppare dipendenza da Xanax
  - **antistaminici sedativi**, medicinali per contrastare le manifestazioni allergiche

\* Se lei assume **Xanax** assieme a uno o più di questi medicinali oppure insieme a bevande alcoliche, queste sostanze possono contribuire a diminuire le funzioni del suo cervello e della sua mente fino a causare la riduzione della capacità spontanea di respirare, il coma e la morte (paragrafo **Avvertenze e precauzioni**).

- **analgesci e sedativi della tosse**, a base di oppio e dei suoi derivati. Questi medicinali, come Xanax, riducono la capacità spontanea di respirare;
- **digossina** (un medicinale usato per aumentare la forza di contrazione del cuore). Se lei è anziano, l'assunzione di Xanax può aumentare la probabilità di sviluppare gli effetti tossici dovuti a digossina;
- **cimetidina**, un medicinale usato per diminuire l'acidità dello stomaco;
- **propossifene**, un medicinale usato contro il dolore;
- **contraccettivi orali**;
- **inibitori delle proteasi** (es. **ritonavir**), medicinali per il trattamento dell'infezione da virus HIV. Se lei è in trattamento con gli inibitori delle proteasi, il medico potrebbe consigliarle anche di interrompere il trattamento con Xanax a causa dell'interazione con questi medicinali;
- **eritromicina, claritromicina e telitromicina** (antibiotici).

### **Xanax con alcol**

**Non** beva alcol durante l'assunzione di Xanax perché l'alcol aumenta gli effetti di questo medicinale.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

**Questo medicinale non deve essere preso nei primi tre mesi di gravidanza** perché può causare malformazioni congenite nel feto.

Il medico valuterà se lei può assumere questo medicinale durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza.

Se lei assume questo medicinale negli **ultimi mesi di gravidanza** oppure durante il **travaglio**, il neonato può manifestare i seguenti sintomi:

- scarso tono dei muscoli (ipotonia assiale);
- difficoltà a respirare (depressione respiratoria o apnea) e ad assumere il latte;
- bassa temperatura corporea (ipotermia);
- sintomi di astinenza (vedere paragrafo 3 “Se interrompe il trattamento con Xanax”).

Questi effetti sono reversibili e possono durare da alcuni giorni fino a 1 - 3 settimane dopo la nascita del bambino.

#### Allattamento

**Non** allatti al seno durante l'assunzione di Xanax perché questo medicinale passa nel latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

**Non** guidi né utilizzi macchinari se durante il trattamento con Xanax manifesta perdita della concentrazione o del controllo dei muscoli o se si sente assonnato o stordito. Questi effetti possono essere aumentati se non ha dormito a sufficienza o se ha assunto bevande alcoliche.

### **Xanax contiene lattosio**

Xanax contiene lattosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere Xanax**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico.

Le compresse di Xanax a rilascio prolungato devono essere prese per bocca, deglutite intere, non devono essere masticate e non devono essere frantumate o divise.

La dose raccomandata è da 3 a 6 mg al giorno, da prendere tutta insieme **una sola volta al giorno**, preferibilmente al mattino.

Il trattamento con Xanax deve iniziare con una dose che varia da 0,5 a 1 mg al giorno. La dose iniziale può essere aumentata gradualmente non superando 1 mg al giorno ogni 3 o 4 giorni e fino ad arrivare alla dose raccomandata giornaliera.

#### Se è anziano o ha difficoltà a respirare

Se è anziano o ha difficoltà a respirare il medico le consiglierà di prendere una dose più bassa di Xanax.

#### Se ha problemi al fegato o le sue condizioni generali di salute sono molto deboli

La dose iniziale raccomandata è 0,5 mg al giorno.

Se necessario la dose può essere aumentata gradualmente.

#### Durata del trattamento

La durata esatta di terapia necessaria per un trattamento efficace degli attacchi di panico non è nota. Dopo assenza prolungata di attacchi di panico, il medico potrà decidere di sospendere gradualmente questo medicinale e la sottoporrà a controlli frequenti. Tuttavia, durante la sospensione graduale potrebbero verificarsi sintomi di astinenza (vedere paragrafo 3 "Se interrompe il trattamento con Xanax").

#### **Passaggio da un trattamento con Xanax compresse a un trattamento con Xanax compresse a rilascio prolungato**

Se lei prende Xanax compresse 3 o 4 volte al giorno, può passare a un trattamento con Xanax compresse a rilascio prolungato prendendo la stessa quantità giornaliera ma assumendola tutta insieme una sola volta al giorno.

#### **Se prende più Xanax di quanto deve**

Se ha preso una dose eccessiva di Xanax contatti immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso più vicino.

- Nei casi lievi i sintomi possono essere: confusione mentale, sonnolenza, difficoltà nel parlare.
- Nei casi più gravi, i sintomi possono essere: perdita della capacità di coordinare i movimenti, scarso tono muscolare, bassa pressione del sangue, problemi di respirazione, coma, morte.

#### **Se dimentica di prendere Xanax**

Se dimentica di prendere una dose, la prenda appena se ne ricorda a meno che non sia quasi ora di assumere la dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

## Se interrompe il trattamento con Xanax

**Non** interrompa l'assunzione di Xanax improvvisamente. Consulti sempre il medico prima di interrompere l'assunzione di Xanax. Lei deve ridurre le dosi gradualmente per evitare di manifestare:

- **sintomi di astinenza** quali:
  - **crisi epilettiche;**
  - sintomi gravi: sensazione di distacco da se stessi o dal mondo esterno, intorpidimento e formicolio delle gambe o delle braccia, aumento della sensibilità alla luce, ai suoni e al contatto fisico, allucinazioni, crampi muscolari e addominali, vomito, sudorazione, tremori, convulsioni;
  - altri sintomi: lieve depressione dell'umore, insonnia, mal di testa, ansia, tensione, irrequietezza, confusione, irritabilità;
- **sintomi di rimbalzo:** ansia e insonnia. Questi sintomi sono gli stessi per i quali le è stato consigliato il trattamento con Xanax e possono ripresentarsi temporaneamente in modo più intenso dopo interruzione brusca del trattamento.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si rivolga **immediatamente** al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati perché l'assunzione di Xanax deve essere **interrotta**:

- effetti opposti rispetto a quelli previsti (**effetti paradossi**) (vedere paragrafo 2 "Disturbi paradossi") quali:
  - irrequietezza
  - disturbi del comportamento
  - delirio
  - agitazione
  - irritabilità
  - aggressività
  - collera
  - incubi
  - allucinazioni
  - difficoltà nell'interpretare correttamente la realtà

Si rivolga **immediatamente** al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati perché possono essere **gravi**:

- gonfiore del viso, della lingua e della gola con conseguente incapacità a deglutire e a respirare (**angioedema**)
- **difficoltà a ricordare** ciò che è accaduto dopo l'assunzione del medicinale (vedere paragrafo 2 "Disturbi della memoria")
- **dipendenza** (vedere paragrafo 2 "Sviluppo di dipendenza")
- **sintomi di astinenza** e **sintomi di rimbalzo** (vedere paragrafo 3 "Se interrompe il trattamento con Xanax")
- distruzione della parte dell'intestino (**enterocolite necrotizzante**)

Si rivolga al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:



**Molto comune** (possono interessare più di 1 persona su 10):

- depressione
- sedazione
- sonnolenza
- perdita della capacità di coordinare i movimenti
- disturbi della memoria
- difficoltà nel parlare
- capogiri
- mal di testa
- stitichezza
- bocca asciutta per mancanza di saliva
- affaticamento
- irritabilità

**Comune** (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- diminuzione dell'appetito, diminuzione o aumento del peso corporeo
- confusione, disorientamento
- aumento o diminuzione del desiderio sessuale, disfunzioni sessuali
- ansia
- insonnia, sonno eccessivo
- nervosismo
- disturbi dell'equilibrio, problemi nella coordinazione dei movimenti
- perdita di attenzione e concentrazione
- eccessiva sonnolenza
- tremori
- vertigini
- parlare in maniera stentata (basciamento)
- offuscamento della vista
- nausea
- dermatiti
- irritabilità

**Non comune** (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- idee e comportamenti ossessivi
- incapacità a provare piacere, sia fisico che emotivo
- incapacità di raggiungere l'orgasmo
- rallentamento globale delle varie funzioni psichiche, in particolare della velocità del pensiero
- stato depressivo
- sensazione di distacco o estraniamento da se stessi o dal mondo esterno
- riduzione o scomparsa delle normali inibizioni
- stato euforico
- paura
- perdita del desiderio sessuale
- attacchi di panico
- rallentamento generalizzato visibile dei movimenti e della velocità nel parlare (rallentamento psicomotorio)
- disturbi del sonno
- disturbo della memoria (amnesia)

- movimenti goffi e impacciati
- convulsioni
- riduzione nella percezione dei sapori e percezione distorta dei sapori
- andatura anomala o accelerata
- aumento di comportamento attivo
- crisi epilettiche con mantenimento o perdita dello stato di coscienza
- mal di testa
- atteggiamenti caratterizzati da eccessiva passività e inerzia nei confronti degli eventi e delle persone (es. stato di impossibilità al movimento e mutismo)
- percezione di ronzio, fischi o fruscio alle orecchie
- palpitazioni
- vampate di calore
- soffocamento, disturbi della respirazione
- dolore all'addome
- diarrea
- mal di stomaco
- vomito
- aumentata predisposizione ai lividi
- eruzioni cutanee
- aumento della sudorazione
- prurito
- debolezza muscolare
- dolore alle articolazioni
- problemi alla schiena
- dolore e crampi ai muscoli
- dolore alle gambe e alle braccia
- incontinenza, volontaria o involontaria perdita ripetuta di urina, stimolo frequente a urinare
- ciclo mestruale irregolare, ritardo del ciclo mestruale
- disturbi dell'eiaculazione
- incapacità per l'uomo a raggiungere l'erezione
- dolore al torace
- alterazione delle sensazioni
- stato di ebbrezza
- sensazione di nervosismo, sensazione di rilassamento
- sindrome influenzale, confusione
- sensazione di corpo estraneo
- lentezza
- senso di sete
- debolezza
- tendenza a cadere
- lesioni alle gambe e alle braccia
- tendenza ad assumere il medicinale in dose eccessiva
- aumento del pericolo di incidenti stradali
- aumento dei livelli di bilirubina (una sostanza prodotta dal fegato) nel sangue
- dipendenza da farmaco
- sindrome da astinenza da farmaco

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- aumento dei livelli di prolattina (un ormone naturale) nel sangue
- cambiamenti di umore
- comportamenti ostili
- pensieri anomali
- accelerazione generalizzata visibile dei movimenti e della velocità nel parlare (iperattività psicomotoria)
- alterazioni del sistema nervoso responsabile delle funzioni dell'organismo che non possono essere controllate volontariamente (es. le funzioni degli organi interni e delle ghiandole)
- contrazione involontaria dei muscoli che costringono ad assumere posizioni innaturali
- malattie dello stomaco e dell'intestino
- malattie infiammatorie del fegato (epatiti)
- alterazione del funzionamento del fegato
- colorazione gialla/giallastra della pelle e delle mucose (ittero)
- reazioni a livello della pelle dovute all'esposizione al sole
- incapacità di svuotare completamente la vescica
- gonfiore delle mani e dei piedi dovuto ad accumulo di liquidi
- aumento della pressione all'interno dell'occhio
- abuso di questo medicinale (tendenza a un uso eccessivo o non corretto di Xanax)

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Xanax**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Xanax**

Il principio attivo è alprazolam.

Una compressa di Xanax da 0,5 mg contiene 0,5 mg di alprazolam.

Una compressa di Xanax da 2 mg contiene 2 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **lattosio**, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato, indigotina (E132).

Una compressa di Xanax da 1 mg contiene 1 mg di alprazolam.

Una compressa di Xanax da 3 mg contiene 3 mg di alprazolam.

Gli altri componenti sono: **lattosio**, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato.

### **Descrizione dell'aspetto di Xanax e contenuto delle confezioni**

Le compresse di Xanax a rilascio prolungato da 0,5 mg sono compresse rotonde, di colore blu, convesse con la scritta "P&U 57" su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/PA in confezioni da 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Le compresse di Xanax a rilascio prolungato da 1 mg sono compresse rotonde, di colore bianco, convesse con la scritta "P&U 59" su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/PA in confezioni da 2, 10, 20, 30, 40, 60, 100 compresse.

Le compresse di Xanax a rilascio prolungato da 2 mg sono compresse pentagonali, di colore blu, con la scritta "P&U 66" su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/PA in confezioni da 10, 20, 30, 60, 100 compresse.

Le compresse di Xanax a rilascio prolungato da 3 mg sono compresse triangolari, di colore bianco, con la scritta "P&U 68" su un lato. Le compresse sono disponibili in blister di alluminio/PA in confezioni da 10, 20, 30, 40, 100 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.

Via Isonzo, 71

04100 Latina

#### **Produttore**

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**