

CINAZYN / CINAZYN FORTE

Cinnarizina

25 mg compresse, 75 mg/ml gocce sospensione, 75 mg capsule, 100 mg capsule

COMPOSIZIONE

* Ogni compressa divisibile di Cinazyn contiene:

Principio attivo: cinnarizina 25 mg

Eccipienti: povidone, saccarosio, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, talco, olio vegetale idrogenato.

* Ogni ml di Cinazyn gocce contiene:

Principio attivo: cinnarizina 75 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina e carmellosa, alcool etilico, polisorbato 20, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di banana, sorbitolo, acqua distillata.

* Ogni capsula di Cinazyn Forte contiene:

Principio attivo: cinnarizina 75 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, talco, sodio stearato, silice precipitata, gelatina, biossido di titanio.

* Ogni capsula di Cinazyn contiene:

Principio attivo: cinnarizina 100 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, talco, sodio stearato, silice precipitata, gelatina, biossido di titanio.

FORME FARMACEUTICHE E CONFEZIONI

- 25 mg compresse divisibili – 50 compresse
- 75 mg/ml gocce sospensione - Flacone da 30 ml
- 75 mg capsule (Cinazyn forte) – 20 capsule
- 75 mg capsule (Cinazyn forte) – 60 capsule
- 100 mg capsule – 50 capsule

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Preparato antivertigine e per migliorare l'irrorazione cerebrale e la circolazione periferica.

ATC : N07CA02

TITOLARE AIC

ITALCHIMICI SPA

Via Pontina 5, km 29

00040 Pomezia (ROMA)

PRODUZIONE E CONTROLLI

25 mg compresse, 75 mg/ml gocce sospensione, 75 mg capsule, 100 mg capsule

ITC FARMA srl
via Pontina 5 km 29
00040 Pomezia (Roma)

75 mg/ml gocce sospensione (**officina di produzione alternativa**):

Zeta Farmaceutici SpA
Via Mentana 38
36100 Vicenza

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Compresse

- Turbe dell'irrorazione cerebrale, in particolare da arteriosclerosi comprendenti tremori, ronzio delle orecchie, disturbi dell'umore (irritabilità e asocialità), perdita della memoria e scarsa concentrazione.
- Alterazioni dell'equilibrio, di origine centrale e periferica comprendenti vertigine, tremori, ronzio delle orecchie, nistagmo, nausea e vomito.
- Coadiuvante nella terapia delle vasculopatie periferiche quali, p.e., estremità bluastre, claudicatio intermittente, ulcere varicose, parestesie (sensazione anormale, non dolorosa come di bruciore, formicolio, puntura, ecc.), crampi notturni, estremità fredde.

Gocce

- Turbe dell'irrorazione cerebrale, in particolare da arteriosclerosi comprendenti tremori, ronzio delle orecchie, disturbi dell'umore (irritabilità e asocialità), perdita della memoria e scarsa concentrazione.
- Alterazioni dell'equilibrio, di origine centrale e periferica comprendenti vertigine, tremori, ronzio delle orecchie, nistagmo, nausea e vomito.
- Terapia delle vasculopatie periferiche quali, p.e., estremità bluastre, claudicatio intermittente, ulcere varicose, parestesie (sensazione anormale, non dolorosa come di bruciore, formicolio, puntura ecc.), crampi notturni, estremità fredde.

Capsule

- Turbe dell'irrorazione cerebrale, in particolare da arteriosclerosi comprendenti tremori, ronzio delle orecchie, disturbi dell'umore (irritabilità e asocialità), perdita della memoria e scarsa concentrazione.
- Terapia delle vasculopatie periferiche quali, p.e., estremità bluastre, claudicatio intermittente, ulcere varicose, parestesie (sensazione anormale, non dolorosa come di bruciore, formicolio, puntura, ecc.), crampi notturni, estremità fredde.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale accertata verso il farmaco. Ictus cerebrale in fase acuta.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Cinazyn potrebbe provocare sofferenza epigastrica: (dolore localizzato alla parte alta dello stomaco): l'assunzione dopo i pasti può diminuire tale effetto.

In pazienti con morbo di Parkinson, Cinazyn dovrebbe essere somministrato solo se i vantaggi terapeutici superano il possibile rischio di aggravamento di questa malattia.

INTERAZIONI

Deprimenti del Sistema Nervoso Centrale / Antidepressivi triciclici: l'uso concomitante potrebbe potenziare gli effetti sedativi di questi farmaci o del Cinazyn.

Interferenza diagnostica: se usato fino a 4 giorni prima di un test cutaneo, Cinazyn potrebbe

inibire reazioni positive a indicatori della reattività cutanea.

Alcol: evitare la contemporanea assunzione di bevande alcoliche.

AVVERTENZE

Cinazyn può causare sonnolenza, specialmente all'inizio del trattamento. Perciò si richiede particolare cautela durante attività quali guida di autoveicoli ed uso di macchinari pericolosi.

AVVERTENZA SPECIALE

La forma farmaceutica gocce contiene alcool etilico: per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcol etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO

Si sconsiglia di usare Cinazyn in gravidanza accertata o presunta, anche se negli studi sugli animali la cinnarizina non ha mostrato effetti teratogeni.

Poiché non ci sono dati relativi all'escrezione di Cinazyn nel latte materno, se ne sconsiglia l'assunzione durante l'allattamento.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Compresse: 1 - 2 compresse da 25 mg 3 volte al dì.

Gocce: 1 ml = 25 gocce = 75 mg di cinnarizina.

- Turbe della circolazione cerebrale: 8-15 gocce (24- 45 mg) 3 volte al giorno o 25 gocce (75 mg) 2 volte al dì.

- Turbe della circolazione periferica: 25 gocce (75 mg) 2-3 volte al dì.

- Turbe vestibolari: 8 gocce (24 mg) 3 volte al giorno o 12 gocce (36 mg) 2 volte al dì.

- Mal di movimento: 8 gocce (24 mg) da assumere mezz'ora prima di intraprendere il viaggio e da ripetere ogni 6 ore.

75 mg capsule:

- Turbe della circolazione cerebrale: 1 capsula 2 volte al dì.

- Turbe della circolazione periferica: 1 capsula 2-3 volte al dì.

100 mg capsule:

- Turbe della circolazione cerebrale: 1 capsula 2 volte al dì.

- Turbe della circolazione periferica: 1 capsula 2-3 volte al dì.

CINAZYN va assunto preferibilmente dopo i pasti.

Si raccomanda di non superare le dosi consigliate.

Dal momento che l'effetto di Cinazyn sulla vertigine è dose-dipendente, il dosaggio dovrebbe essere aumentato gradualmente.

Terapia di mantenimento

Un miglioramento sintomatico può sopravvenire rapidamente. Può tuttavia essere necessario un

trattamento di mantenimento al fine di ottenere risultati durevoli nel tempo. Essendo ben tollerato, alle dosi terapeutiche Cinazyn si adatta anche ad una terapia di mantenimento. Nel trattamento dei pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.

SOVRADOSAGGIO

In un singolo caso di sovradosaggio acuto (2100 mg), in un bambino di 4 anni, sono stati osservati vomito, sonnolenza, coma, tremore, ipotonia (diminuzione del tono muscolare).

La guarigione del bambino è avvenuta senza conseguenze.

Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio, ma possono essere di aiuto una lavanda gastrica e la somministrazione di carbone attivo.

EFFETTI INDESIDERATI

Possono verificarsi sonnolenza e disturbi gastro-intestinali. Tali disturbi sono generalmente transitori e possono essere prevenuti instaurando la posologia ottimale in maniera graduale. In rari casi possono essere osservati mal di testa, secchezza della bocca, aumento di peso, sudorazione o reazioni allergiche.

Nei pazienti anziani sono stati descritti casi di aggravamento o comparsa di fenomeni extrapiramidali, talvolta associati a sensazione di depressione, nel corso di trattamenti di lunga durata. In tali casi il trattamento deve essere interrotto.

Riferire al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto collaterale osservato e non ancora sopra descritto.

CONSERVAZIONE

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

**DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:
MAGGIO 2010**