

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Actigrip Gola 100mg/100ml collutorio

Esetidina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Actigrip Gola e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Actigrip Gola
3. Come usare Actigrip Gola
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Actigrip Gola
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Actigrip Gola e a cosa serve

Questo medicinale contiene esetidina, un principio attivo che agisce contro vari tipi di batteri e funghi, e contro l'infiammazione da essi causata.

Actigrip Gola è un collutorio usato per ridurre il numero dei germi in caso di infezioni della bocca o della gola di lieve entità, che causano dolore e arrossamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Actigrip Gola

Non usi Actigrip Gola

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in bambini con meno di 6 anni di età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Actigrip Gola.

Come per altri prodotti destinati ad essere impiegati localmente, l'uso specie se prolungato di questo medicinale, può causare fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, interrompa il trattamento e consulti il medico che le prescriverà una terapia adeguata.

Nei bambini di età superiore a 6 anni Actigrip Gola deve essere usato solo dopo avere consultato il medico e aver valutato con lui i rischi e i benefici derivanti dal trattamento.

Altri medicinali e Actigrip Gola

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non sono stati effettuati studi di interazione con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza o se sta allattando con latte materno, non assuma Actigrip Gola senza aver prima consultato il medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Actigrip Gola non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Actigrip Gola contiene:

- piccole quantità di etanolo (alcool) inferiori a 100 mg per dose;
- colorante azorubina (E122), che può causare reazioni allergiche.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

3. Come usare Actigrip Gola

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o secondo le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 cucchiaio (15 ml) di Actigrip Gola, 2 volte al giorno (mattino e sera).

Questo medicinale è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Effettui degli sciacqui o dei gargarismi, per 30 secondi, senza ingerire il prodotto.

Non usi Actigrip Gola a dosi maggiori di quelle consigliate.

Eviti un uso prolungato di Actigrip Gola.

Bambini

Actigrip Gola non deve essere usato nei bambini con meno di 6 anni di età.

Nei bambini di età superiore a 6 anni Actigrip Gola deve essere usato solo dopo avere consultato il medico.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento dei sintomi.

Se prende più Actigrip Gola di quanto deve

L'ingestione di quantità elevate di Actigrip Gola potrebbe causare sintomi di intossicazione da alcool, quali: difficoltà nella coordinazione dei movimenti, confusione, alterazioni del comportamento e del linguaggio, rallentamento del respiro e dei riflessi.

In tal caso, consulti il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Actigrip Gola

Non usi una dose doppia per compensare la dose dimenticata, ma continui ad usare il medicinale come descritto nel paragrafo 3: Come prendere Actigrip Gola.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Smetta di usare Actigrip Gola e contatti immediatamente il medico se nota reazioni allergiche quali: prurito e/o macchie sulla cute (orticaria), gonfiore delle labbra, degli occhi, del viso, della gola (angioedema), difficoltà a respirare (dispnea).

Contatti il medico, se durante l'uso di questo medicinale, nota i seguenti effetti indesiderati:

- irritazione della bocca e della gola, alterazione della sensibilità della bocca (parestesia), secchezza della bocca, scolorimento della lingua o dei denti, infiammazione, formazione di bolle o ulcere nel sito di applicazione;
- alterazioni, diminuzione o perdita del gusto (ageusia, disgeusia), difficoltà a deglutire (disfagia), ingrossamento delle ghiandole salivari, nausea, vomito, tosse.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Actigrip GOLA

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservi Actigrip Gola ad una temperatura inferiore a 30°C e protetto dalla luce.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese ed è valida per il prodotto chiuso.

Una volta aperto il flacone, deve conservare Actigrip Gola a temperatura inferiore a 25°C ed usarlo entro 6 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Actigrip Gola

Il principio attivo è: esetidina.

100 ml di collutorio contengono: 100 mg di esetidina.

Gli altri componenti sono: polisorbitan monostearato (polisorbato 60), **etanolo** 96%, acido citrico monoidrato, saccarina sodica, **azorubina** 85% (E 122), levomentolo, sodio calcio EDTA, sodio idrossido, essenza di eucalipto, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Actigrip Gola e contenuto della confezione

Actigrip Gola è un collutorio, disponibile in flacone da 200 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia ROMA

Produttore

Famar Orléans – 5, Avenue de Concyr – 45071 Orléans Cedex 2 (Francia).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il