

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO 20 mg/ml gocce orali, soluzione **ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO 3 mg/ml sciroppo** **ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO 15 mg pastiglie** dropropizina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO
3. Come prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO e a cosa serve

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO contiene il principio attivo dropropizina, appartenente alla classe dei sedativi della tosse.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO è utilizzato per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Non prenda ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

- Se è allergico alla dropropizina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- Se è in gravidanza o sta allattando con latte materno.
 - Se la sua tosse è accompagnata da molto catarro (ipersecrezione bronchiale) o ha difficoltà ad eliminarlo (ridotta funzione mucociliare).

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie non deve essere usato nei bambini con meno di 6 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO. Usi con cautela e chiedi consiglio al medico prima di usare ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO se soffre di problemi ai reni.

Non usi ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO per lunghi periodi di tempo. Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

Bambini

Usi nei bambini con meno di 6 anni esclusivamente ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione o ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo e sotto diretto controllo del medico.

Altri medicinali e ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni di ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO con altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Non prenda ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO se è in gravidanza o se sta allattando con latte materno.

Se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO potrebbe causare debolezza (spossatezza) e sonnolenza. Faccia particolare attenzione prima di mettersi alla guida di veicoli o di usare macchinari.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato

Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo contiene fruttosio e alcool

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale;

Questo medicinale contiene piccole quantità di etanolo (alcool) inferiori a 100 mg per dose.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie contiene saccarosio e glucosio:

- se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione

- La dose raccomandata è: *bambini da 6 mesi a 1 anno*: 5 gocce, 3 - 4 volte al giorno;
- *bambini da 1 a 3 anni*: 10 gocce, 3 - 4 volte al giorno;
- *bambini da 3 a 13 anni*: 20 gocce, 3 - 4 volte al giorno;
- *ragazzi oltre 13 anni e adulti*: 40 gocce, 3 - 4 volte al giorno oppure 20 gocce, 6 - 8 volte al giorno.

Utilizzi il contagocce inserito nel flaconcino per prendere la dose corretta

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo

- La dose raccomandata è :
- *bambini da 6 mesi a 1 anno*: 1/4 cucchiaino, 3 - 4 volte al giorno;
- *bambini da 1 a 3 anni*: 1/2 cucchiaino, 3 - 4 volte al giorno;
- *bambini da 3 a 13 anni*: 1 cucchiaino, 3 - 4 volte al giorno;
- *ragazzi oltre 13 anni e adulti*: 2 cucchiaini, 3 - 4 volte al giorno oppure 1 cucchiaino, 6 - 8 volte al giorno.

Utilizzi un cucchiaino da tè (5 ml) per prendere la dose corretta:

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie

La dose raccomandata è:

bambini da 6 a 13 anni: 1 pastiglia, 3 - 4 volte al giorno.

- *ragazzi oltre 13 anni e adulti*: 1 pastiglia, 4 - 8 volte al giorno.

Prenda la pastiglia lasciandola sciogliere lentamente in bocca.

Non superi le dosi consigliate.

Se prende più ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO di quanto deve, contatti il medico.

Se dimentica di prendere ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati con l'uso di ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO:

- debolezza (spossatezza), stanchezza (astenia), sonnolenza, diminuzione delle normali attività (torpore), mal di testa e vertigini;
- nausea o altri disturbi allo stomaco o all'intestino.

In questi casi interrompa il trattamento e informi il medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione: non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie: non conservare al di sopra di 30°C.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese ed è valida per il prodotto chiuso.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO

Il principio attivo è: dropropizina.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione

1 ml di soluzione (corrispondente a 25-27 gocce) contiene: 20 mg di dropropizina

Gli altri componenti sono: acido citrico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, olio di ricino idrogenato, simeticone, anetolo, anice, acqua depurata.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo

1 ml di sciroppo contiene: 3 mg di dropropizina.

Gli altri componenti sono: fruttosio, glicerina, alcool, acesulfame, aroma fragola, acido fumarico, etilvanillina, idrossietilcellulosa, acido benzoico, sodio benzoato, acqua depurata.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie

1 pastiglia contiene 15 mg dropropizina.

Gli altri componenti sono: saccarosio, glucosio, acido citrico, aroma fragola.

Descrizione dell'aspetto di ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO e contenuto della confezione

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione è disponibile in flacone da 25 ml munito di contagocce.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo è disponibile in flacone da 150 ml.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie è disponibile in confezione da 24 pastiglie.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Johnson & Johnson S.p.A. - Via Ardeatina Km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia, Roma

Produttore

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO sciroppo

Famar Orléans - 5, Avenue de Concyr - 45071 Orleans Cedex 2 - Francia.

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO gocce orali, soluzione:

Cosmo S.p.A. - Via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano)

ACTIGRIP TOSSE SEDATIVO pastiglie

Dr. Soldan GmbH, Höchstadter Str. 33 - 91325 Adelsdorf (Germania)

Lamp San Prospero S.p.A. Via della Pace, 25/A - San Prospero (MO)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il