

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONE PER L'UTILIZZATORE

### **MYLICONACID compresse masticabili** (famotidina, magnesio idrossido, calcio carbonato)

LEGGA ATTENTAMENTE QUESTO FOGLIO POICHE' CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LEI

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione medica. Tuttavia deve usarlo in modo accurato per ottenere i migliori risultati.

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo
- Se desidera maggiori informazioni o consigli si rivolga al farmacista.
- Se i suoi sintomi non migliorano dopo 2 settimane, deve contattare il medico.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio informi il medico o il farmacista.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è MYLICONACID e a che cosa serve
2. Prima di prendere MYLICONACID
3. Come usare MYLICONACID
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MYLICONACID
6. Altre informazioni

#### **1. CHE COSA E' MYLICONACID E A CHE COSA SERVE**

MYLICONACID si usa per il trattamento sintomatico a breve termine del bruciore di stomaco e dei disturbi digestivi caratterizzati da acidità negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 16 anni.

Le compresse contengono tre principi attivi:

- la famotidina è un medicinale chiamato H<sub>2</sub> bloccante, riduce la produzione di acido nello stomaco;
- il magnesio idrossido ed il calcio carbonato sono antiacidi, neutralizzano l'acido nello stomaco.

#### **2. PRIMA DI PRENDERE MYLICONACID**

##### **Non usi MYLICONACID se:**

- è allergico ad uno qualsiasi degli eccipienti della compressa.
- ha problemi renali gravi

##### **Faccia particolare attenzione con MYLICONACID:**

Prima di prendere MYLICONACID consulti il suo medico se ha:

- cattiva digestione e perdita di peso
- difficoltà a deglutire
- dolore allo stomaco che non passa
- cattiva digestione per la prima volta o se i suoi sintomi sono cambiati di recente
- troppo calcio nel sangue
- troppo poco fosforo nel sangue
- troppo calcio nelle urine o una storia di calcoli renali

➤ problemi ai reni o al fegato.

Se usa MYLICONACID per periodi prolungati si possono alzare i livelli di calcio nel sangue. Ciò è ancora più probabile se sta assumendo anche altri medicinali che contengono calcio e/o vitamina D. Se ciò si verificasse, i reni potrebbero soffrirne.

### **Precauzioni per l'uso:**

Se i sintomi persistono o peggiorano dopo 2 settimane, sospenda il trattamento e consulti il medico.

### **Assunzione di MYLICONACID con altri medicinali**

- Se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica, informi il medico o il farmacista perché MYLICONACID può interagire con essi.
- MYLICONACID può impedire l'assorbimento corretto di altri medicinali.  
Per questa ragione non prenda MYLICONACID entro le 2 ore dall'assunzione di altri medicinali.  
Se sta assumendo un antibiotico chiamato chinolone, deve lasciare un intervallo di 4 ore.
- MYLICONACID contiene famotidina e antiacidi (carbonato di calcio e magnesio idrossido). Non assuma altri medicinali contenenti queste sostanze se sta prendendo MYLICONACID oltre la dose massima raccomandata.

### **Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale, incluso MYLICONACID.

**Gravidanza:** E' meglio non assumere MYLICONACID durante la gravidanza

**Allattamento:** Non assuma MYLICONACID se sta allattando perché il medicinale passa nel latte e potrebbe nuocere al suo bambino.

### **Guida di veicoli e utilizzo dei macchinari**

Se compaiono capogiri, i pazienti non devono guidare o usare macchinari.

### **Informazioni importanti su alcuni eccipienti di MYLICONACID**

Se il suo medico le ha detto che è intollerante ad alcuni zuccheri, non assuma MYLICONACID perché contiene lattosio, glucosio e saccarosio.

## **3. COME USARE MYLICONACID**

### **Adulti (sopra i 16 anni di età)**

- In caso di bruciore di stomaco o cattiva digestione, mastichi completamente una compressa. Beva un bicchiere d'acqua, se possibile, per inghiottire la compressa masticata.
- Non assuma più di 2 compresse al giorno
- Non assuma MYLICONACID per più di 2 settimane (Vedere anche paragrafo 2 "Faccia particolare attenzione con MYLICONACID")

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo prodotto, si rivolga al farmacista.

### **Se prende più MYLICONACID di quanto deve**

Chieda consiglio al medico o al farmacista.

### **Se dimentica di prendere MYLICONACID**

Non assuma una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

#### 4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, MYLICONACID può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Questa tabella spiega il significato delle frequenze degli effetti indesiderati:

Comuni	Meno di 1 su 10 pazienti trattati li riportano
Non comuni	Meno di 1 su 100 pazienti trattati li riportano
Molto rari	Meno di 1 su 10.000 pazienti trattati li riportano

**Comuni:** mal di testa

**Non comuni:**

- Nausea
- Capogiri
- Eruttazione
- Formicolio
- Alterazione del gusto
- Diarrea
- Flatulenza
- Bocca secca
- Gonfiore di stomaco
- Nervosismo
- Disturbi digestivi
- Sete
- Mal di stomaco

Agenzia Italiana del Farmaco

**Molto rari:** questi effetti indesiderati sono stati riportati da persone che assumevano alte dosi di famotidina, uno dei principi attivi di MYLICONACID:

- eruzioni cutanee come prurito, orticaria o gravi vescicolazioni.
- Reazioni allergiche inclusi collasso, gonfiore intorno alla bocca e asma.

Se appaiono sintomi come gonfiore del viso, lingua e/o faringe e/o difficoltà a deglutire o orticaria con difficoltà di respiro, deve sospendere il trattamento e recarsi immediatamente dal medico.

- Problemi al fegato inclusi ostruzione del flusso biliare o valori alterati nei risultati dei test sul sangue.
- Disturbi del sistema nervoso come allucinazioni, confusione, disturbi del sonno, crisi, sonnolenza, agitazione e depressione.
- Disturbi del sangue come per esempio abbassamento della conta delle cellule della coagulazione o dei globuli bianchi, intossicazione del midollo spinale e grave anemia. Una riduzione del numero dei globuli bianchi può abbassare la sua resistenza alle infezioni. Perciò se ha un'infezione in corso con sintomi come febbre e grave peggioramento delle sue condizioni generali, o febbre con sintomi di infezioni locali come mal di gola/faringe/bocca o problemi urinari, consulti immediatamente il medico. Sarà richiesta un'analisi del sangue per verificare la possibile riduzione dei globuli bianchi.
- Crampi
- Impotenza, ridotto impulso sessuale e sensibilità al seno.

Gli altri due componenti di MYLICONACID (magnesio idrossido e calcio carbonato) possono causare variazione nella frequenza e consistenza delle feci, gonfiore e senso di pienezza.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio informi il medico o il farmacista.

## 5. COME CONSERVARE MYLICONACID

Questo medicinale non richiede particolari condizioni per la conservazione ma tenga MYLICONACID fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sul blister e sull'astuccio.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

### Cosa contiene MYLICONACID:

I principi attivi di MYLICONACID sono: famotidina (10 mg), magnesio idrossido (165 mg), calcio carbonato (800 mg).

Gli eccipienti sono: amido di mais pregelatinizzato, sodio laurilsolfato, destrati, zucchero a velo (saccarosio e amido di mais), lattosio monoidrato, cellulosa acetato, magnesio stearato, ipromellosa, iprolosa, aroma di menta, aroma di crema (contiene glucosio) e ferro ossido rosso.

### Descrizione dell'aspetto di MYLICONACID e contenuto della confezione

MYLICONACID è una compressa di colore rosa, masticabile, marcata con una "P".

Ogni confezione contiene 6, 12 compresse

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Johnson & Johnson SpA Via Ardeatina km 23,500 - 00040 Santa Palomba - Pomezia ROMA

Produttore: Janssen- Cilag S.p.A. Via C. Janssen, 04010 Borgo S. Michele, Latina-Italia

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

Francia: PEPCIDDUO, comprimé à croquer  
Germania: PEPCIDDUAL kautablette  
Spagna: PEPDUAL  
Inghilterra: PEPCIDTWO, chewable indigestion tablets  
Irlanda: PEPCIDTWO, chewable tablets  
Finlandia PEPCID DUO, chewable tablet  
Norvegia: PEPCIDDUO, pakningsvedlegg  
Svezia: PEPCID DUO chewable tablets

Data dell'ultima approvazione di questo foglio illustrativo: Gennaio 2013

### **Note di educazione sanitaria**

Cambiamenti nella dieta (cibi acidi o piccanti, bevande alcoliche ecc...) o alcuni medicinali (aspirina, farmaci antiinfiammatori, ecc...) possono causare dolore e/o bruciore di stomaco e acidità gastrica. Non esiti a consultare il suo medico o farmacista.

Le seguenti regole dovrebbero aiutarla ad evitare i sintomi:

- eviti pasti abbondanti e grassi
- eviti alcuni alimenti quali cioccolata, spezie, peperoni, succo di agrumi, bevande gasate.
- vari la sua dieta,
- perda ogni eccesso di peso,
- eviti sforzi intensi subito dopo mangiato,
- eviti il fumo e limiti il consumo di alcool.

Il farmacista e il suo medico conoscono il medicinale. Non esiti a rivolgersi a loro per un consiglio