

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO 1,3 mg compresse

Cetilpiridinio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 1-2 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO
3. Come prendere GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO e a cosa serve

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO contiene il principio attivo cetilpiridinio cloruro che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettiche che impediscono o bloccano la crescita dei batteri.

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO si usa come disinfettante della mucosa orale (bocca e gola).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 1-2 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

NON prenda GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO :

- se è allergico al cetilpiridinio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- nei bambini al di sotto dei 12 anni, salvo diversa prescrizione del medico (Vedere il paragrafo "Bambini").

Avvertenze e precauzioni

Se dopo un breve periodo di trattamento non nota un miglioramento dei sintomi, consulti il suo medico curante.

Se assume GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO per periodi di tempo prolungati, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso, sospenda il trattamento e consulti il suo medico che stabilirà una terapia adeguata.

Bambini

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO non deve essere assunto dai bambini di età inferiore ai 12 anni, salvo diversa prescrizione del medico.

Altri medicinali e GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Se sta assumendo GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO, non usi altri medicinali antisettici o detergenti della bocca e della gola.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non sono disponibili dati relativi all'uso del cetilpiridinio cloruro durante la gravidanza.

Se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno, prenda GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO contiene saccarosio

GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO contiene saccarosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. Questo medicinale contiene 1,4 g di saccarosio per compressa: ne tenga conto se soffre di diabete o se deve seguire una dieta ipocalorica.

3. Come prendere GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 compressa alla volta, fino ad un massimo di 8 compresse al giorno.

Dopo aver preso una compressa di GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO, lasci trascorrere almeno 2-3 ore prima di assumerne un'altra.

Sciolga le compresse lentamente in bocca.

Non superi la dose raccomandata.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se prende più GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO di quanto deve

Se prende più GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO di quanto deve, interrompa il trattamento e si rivolga immediatamente al medico o al più vicino ospedale.

In seguito all'assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale si possono manifestare i seguenti sintomi: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi), sensazione di soffocamento (asfissia) dovuta alla paralisi dei muscoli respiratori, riduzione dell'attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione del sangue (ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).

Il medico stabilirà la terapia più adatta a lei, in base alla gravità dei sintomi.

Se dimentica di prendere GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere valutata dai dati disponibili)

- bruciore o irritazione della bocca;
- irritazione temporanea delle gengive;
- nausea, vomito e dolore all'addome;
- infiammazione della bocca (stomatite);
- alterazione del gusto;
- lieve cambiamento del colore dei denti;
- irritazione della pelle (dermatite allergica).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO

- Il principio attivo è cetilpiridinio cloruro. Ogni compressa contiene 1,3 mg di cetilpiridinio cloruro.
- Gli altri componenti sono: gomma arabica, magnesio stearato, aroma naturale di menta, saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di GOLASEPT ANTISETTICO OROFARINGEO e contenuto della confezione

Confezione da 20 compresse.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

ZETA FARMACEUTICI S.P.A., via Mentata, 38 – 36100 VICENZA (VI).

Produttore

Lab. Chimico Farmaceutico A.SELLA s.r.l. – via Vicenza 67 – 36015 Schio (VI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 19/10/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).