

**PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

LENIL
Clorexidina dicloridrato

Composizione:

100 g contengono:

Principio attivo: Clorexidina dicloridrato 1 g.

Eccipienti: Zinco ossido, Calcio carbonato, Estratto di Echinacea, Estratto Iperico, Alcool benzilico, Olio vegetale, Olio di fegato di merluzzo, Miristato isopropile, Lanolina, Sorbitolo, Fattylian, Phenonip, Fragranza FF 5031, Acqua deionizzata.

Come si presenta:

LENIL si presenta in forma di crema: il contenuto della confezione è di un tubo da 40 g di prodotto.

Che cosa è: LENIL è una crema disinfettante per uso topico dermatologico (ATC: D08AC02).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Mentana n° 38 - 36100 Vicenza

Produttore e Controllore finale:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A., Via Galvani n°10, 36066 Sandrigo (VI)

Perché si usa:

LENIL si usa per la disinfezione della cute lesa a causa di ustioni, ferite, piaghe, etc..

Quando non deve essere usato:

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (saponi, detergenti anionici).

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico

In gravidanza ed allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:

LENIL può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Il prodotto è solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

LENIL non ha alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

LENIL è incompatibile con detergenti anionici, saponi, borati, cloruri, citrati, nitrati, fosfati e solfati.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (vedere "Quando medicinale non deve essere usato")

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una idonea terapia.

Note di educazione sanitaria:

Nel caso di ustioni di piccola entità: pulire bene la parte interessata e bendare la zona interessata.

Si può fare ricorso a LENIL nei casi di medicazione occasionale e sintomatica.

Come usare questo medicinale
Quanto, quando, come e per quanto tempo

Spalmare delicatamente la crema sulla cute interessata, in strato sottile, una o più volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale:

Non sono noti inconvenienti dovuti ad un sovradosaggio.

L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Effetti indesiderati

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare il recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità: marzo 2001