

**VITEF**  
“2% crema”  
(Vitamina F)

**PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

Questo è un medicinale di **AUTOMEDICAZIONE** che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

**-Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.**

**-Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: VITEF (Vitamina F).**

**COMPOSIZIONE:** 100 g di crema al 2% contengono: **PRINCIPIO ATTIVO:** Acidi grassi polinsaturi essenziali ( Vitamina F) g 2. **ECCIPIENTI:** Paraffina liquida, Lanolina acetilata, Alcoli della lanolina, Acido stearico, Glicerilmonostearato, Butilidrossianisolo, Butilidrossitoluolo, Metil p-idrossibenzoato, Propile p-idrossibenzoato, Glicole propilenico, Sodio laurilsolfato, Profumo di Manila, Acqua depurata.

**COME SI PRESENTA.**

VITEF si presenta in forma di crema; ogni tubo contiene 50 g di crema.

**CHE COSA E'.**

VITEF è un medicinale dermatologico emolliente e protettivo; serve per ammorbidire e proteggere la pelle.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.**

TEOFARMA S.r.l. Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE.**

TEOFARMA S.r.l.. Viale Certosa 8/A - 27100 Pavia.

**PERCHE' SI USA.**

VITEF si usa come coadiuvante nelle affezioni cutanee in fase desquamativa (eczemi, psoriasi, crosta latte).

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO.**

Ipersensibilità verso i componenti o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

E' opportuno consultare il medico nel caso in cui tali disturbi si fossero già manifestati in passato.

Vedasi anche capitolo relativo a **GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO.**

**QUANDO PUO' ESSERE USATO SOLO DOPO AVERE CONSULTATO IL MEDICO.**

In gravidanza e nell'allattamento VITEF deve essere usato solo dopo avere consultato il medico ed avere valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso, poiché non è stato accertato da studi clinici ed epidemiologici l'effetto del medicinale sulla gravidanza e sull'allattamento. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

**COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO.**

In gravidanza e nell'allattamento VITEF deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e avere valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

**QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE.**

Non è nota nessuna interazione.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

## **E' IMPORTANTE SAPERE CHE.**

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il proprio medico. Se si verificasse una reazione allergica (persistente arrossamento della pelle o gonfiore delle mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso), interrompete immediatamente l'uso del medicinale e consultate il vostro medico.

Il medicinale contiene derivati dell'acido benzoico; l'acido benzoico è un debole irritante di cute, occhi e mucose; può causare allergia e asma; può aumentare il rischio di ittero nei neonati.

Non usare VITEF in prossimità delle congiuntive oculari.

Questo medicinale contiene lanolina, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

VITEF contiene metil p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato, che possono causare reazioni allergiche (eventualmente di tipo ritardato), e glicole propilenico che può causare irritazione cutanea.

VITEF contiene inoltre butilidrossianisolo e butilidrossitoluolo, che possono causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE.**

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Applicare uno strato sottile di crema una-due volte al giorno.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

## **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE.**

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VITEF avvertite immediatamente il vostro medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

## **EFFETTI INDESIDERATI.**

Alle dosi consigliate non sono noti effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.

Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

## **SCADENZA E CONSERVAZIONE.**

Attenzione : non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare a temperatura non superiore a 25° C.

E' importante tenere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola sia il foglio illustrativo.

## **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Giugno 2010

Agenzia Italiana del Farmaco