

CINETIC

COMPOSIZIONE

Ogni compressa rivestita contiene:

Principio attivo: Tiroide secca microgranuli mg 75 (pari a levotiroxina sodica mcg 25,5; liotironina sodica mcg 7,5; iodio organico mg 0,150 in combinazione tiroidea).

Eccipienti: Emdex, Calcio fosfato bibasico, Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Talco, Gomma sandracca, Gomma arabica, Gelatina, Saccarosio, Titanio biossido (E 171), Indigotina (E 132), Povidone, Cera d'api bianca.

FORME FARMACEUTICHE E CONFEZIONI

“ 75 mg compresse rivestite” 50 compresse

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Il CINETIC trova il suo campo d'impiego nelle forme conclamate di ipotiroidismo e in numerose e varie forme di carenza secretoria della tiroide. Il CINETIC per la sua azione attivante sul metabolismo risulta essere efficace anche nella terapia dell'obesità disendocrina.

TITOLARE A.I.C.

TEOFARMA S.r.l. – Via F.lli Cervi 8 – 27010 Valle Salimbene (PV)

OFFICINA DI PRODUZIONE

TEOFARMA S.r.l. – V.le Certosa 8/A – 27100 Pavia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Stati di ipotiroidismo, mixedema, condizioni di metabolismo subnormale o rallentato, obesità disendocrina.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti.

Il prodotto non deve essere somministrato a pazienti affetti da ipertiroidismo, gravi disfunzioni cardiache e circolatorie, infarto, malattie infettive ed intolleranza allo iodio.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Per i pazienti diabetici l'opportunità della cura deve essere valutata dal medico, la somministrazione di CINETIC infatti aumenta il fabbisogno di preparati che regolano il tasso glicemico del sangue, sospendendo la cura il paziente ritorna alla norma.

Il prodotto non va somministrato durante la gravidanza.

AVVERTENZE

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.
CONSERVARE A TEMPERATURA NON SUPERIORE A 25° C.

CINETIC contiene saccarosio: in caso di accertata intolleranza agli zuccheri contattare il medico curante prima di assumere il medicinale.

DOSE, MODO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE

1-2 compresse 3 volte al dì.

Seguire le indicazioni del medico variabili secondo i casi.

Le compresse vanno ingerite con un bicchiere d'acqua non troppo fredda, acqua minerale o tè leggero, senza masticarli e senza scioglierli. Il tè forte, il caffè e le bevande alcoliche sono sconsigliati.

IPERDOSAGGIO

La comparsa di tachicardia, aritmia cardiaca, sintomi di angina pectoris, nervosismo, insonnia, irregolarità mestruali, dimagrimento eccessivo, sono indice di iperdosaggio o di intolleranza al preparato; è perciò necessario consultare il medico, che deciderà sulla opportunità di ridurre il dosaggio o, eventualmente, sospendere la cura.

EFFETTI INDESIDERATI

Poiché in soggetti trattati con preparati tiroidei sono stati riportati rari casi di disfunzione epatica, si raccomanda di ridurre il dosaggio o di sospendere il trattamento qualora nel corso della terapia comparissero febbre, debolezza muscolare o anomalie dei tests di laboratorio per la funzionalità epatica. Come già detto al paragrafo "Iperdosaggio" la comparsa di tachicardia, aritmia cardiaca, sintomi di angina pectoris, nervosismo, insonnia, irregolarità mestruali, dimagrimento eccessivo, sono indice di iperdosaggio o di intolleranza al preparato; è perciò necessario consultare il medico, che deciderà sulla opportunità di ridurre il dosaggio o, eventualmente, sospendere la cura. L'uso di farmaci aventi attività ormonale sulla tiroide per il trattamento dell'obesità è pericoloso poiché, alle dosi necessarie, può provocare reazioni secondarie anche di considerevole entità.

Si invita il paziente a comunicare al proprio medico la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato diverso da quelli sopra riportati.

Attenzione: Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Ultima revisione: Giugno 2010