

VIT-EPARIN

Eparina sodica + Tocoferolo 5.000 U.I./ml + 1 mg/ml collirio soluzione

COMPOSIZIONE

100 ml contengono:

PRINCIPI ATTIVI: eparina sodica UI 500.000; d-l a tocoferil acetato mg 100.

ECCIPIENTI: sodio cloruro; fosfato monosodico 2H₂O; fosfato bisodico 12H₂O; mertiolato sodico; polisorbato 80; acqua per preparazioni iniettabili.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

5.000 U.I./ml + 1 mg/ml collirio soluzione - 1 flacone 5 ml.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Anticoagulante (antitrombotico dei vasi retinici).

TITOLARE AIC

TEOFARMA Srl
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)

PRODUTTORE

TEOFARMA Srl
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Emorragie endobulbari di qualunque natura (traumatica, angiopatica), e loro postumi. Coadiuvante nelle emorragie retiniche di natura arteriosclerotica ed edemi della testa del nervo ottico e della retina, e nelle forme vascolari retiniche in genere. Residui catarattosi, opacità corneali, cheratite bollosa; inoltre ha azione fibrinolitica, calmante nelle bruciate termiche e chimiche della congiuntiva e della cornea.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale nei confronti del prodotto.
Ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione.

PRECAUZIONI PER L'USO

Uso esterno. Il prodotto dopo apertura del contenitore deve essere utilizzato entro 10 giorni.

INTERAZIONI

L'uso concomitante di salicilici, testosterone, clorpromazina, alcool, può potenziare l'azione dell'eparina.

AVVERTENZE

Nel trattamento con anticoagulanti occorre soppesare accuratamente i benefici contro il rischio di complicazioni emorragiche.

Inoltre dovrebbe essere evitato l'uso in pazienti con malattie cerebrovascolari, a cui siano stati somministrati salicilici; questi come il testosterone, la clorpromazina, l'alcool possono direttamente od indirettamente potenziarne l'azione.

Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Istillare nell'occhio 2 gocce tre volte al dì, salvo diversa prescrizione del medico.

EFFETTI COLLATERALI

Dopo un trattamento prolungato sono stati evidenziati effetti collaterali di 3 tipi:

reazioni allergiche - alopecia transitoria reversibile ed emorragie da emocoagulazione normale.

Nel caso in cui dovessero manifestarsi fenomeni di sensibilizzazione è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea.

Se dovessero comparire effetti indesiderati non descritti rivolgersi al medico o al farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Questa specialità medicinale contiene mertiolato come conservante e quindi è possibile che si verifichino reazioni allergiche.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco:
Settembre 2012.

Agenzia Italiana del Farmaco