

COXANTURENASI
A11JA Piridossina + Codecarbossilasi
Fiale i.m. - e.v.

COMPOSIZIONE

Fiale uso intramuscolare

1 fiala liofilizzata contiene: PRINCIPIATTIVI: piridossina HCl 300 mg; piridossal-5-fosfato 10 mg.

ECCIPIENTI: sodio metabisolfito, sodio fosfato, lattosio, sodio idrossido, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato.

1 fiala solvente da 4 ml contiene: lidocaina cloridrato, tampone q.b. a pH $5 \pm 0,1$ (sodio acetato, acido cloridrico), acqua p.p.i.

Fiale uso endovenoso

1 fiala liofilizzata contiene: PRINCIPIATTIVI: piridossina HCl 300 mg; piridossal-5-fosfato 10 mg.

ECCIPIENTI: sodio metabisolfito, sodio fosfato, lattosio, sodio idrossido, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato.

1 fiala solvente da 4 ml contiene: acqua p.p.i.

FORMA FARMACEUTICA

3 fiale 300 mg piridossina HCl + 10 mg piridossal-5-fosfato i.m. liofilizzato + 3 fiale solvente 4 ml

3 fiale 300 mg piridossina HCl + 10 mg piridossal-5-fosfato e.v. liofilizzato + 3 fiale solvente 4 ml.

CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA

Prodotto vitaminico.

TITOLARE AIC

TEOFARMAS.r.l.

Sede: Valle Salimbene (PV) - Via F.lli Cervi, 8

PRODUTTORE

- fiala liofilizzata:

Alfa Wassemann - Contrada S. Emidio - Alanno (PE)

- fiala solvente:

Teofarma S.r.l. - Viale Certosa 8/A - Pavia

CONFEZIONAMENTO

Teofarma S.r.l. - Viale Certosa 8/A - Pavia

INDICAZIONI

Terapie e profilassi di stati carenziali di Vitamina B6 e del suo coenzima.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità già note verso i componenti. TEOFARMA

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Nei pazienti affetti da grave insufficienza epatica e renale è opportuno che la somministrazione della specialità sia eseguita evitando la via intramuscolare e la endovenosa rapida.

In tali casi è consigliabile invece ricorrere alla infusione per flebo di soluzioni lente e in dosi opportunamente ridotte.

L'uso della specialità è sconsigliato durante l'allattamento.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI

Evitare la somministrazione di coxanturenasi nei soggetti che fanno uso di L-dopa.

AVVERTENZE

COXANTURENASI contiene sodio metabisolfito; tale sostanza raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

Questo medicinale contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (eventualmente di tipo ritardato).

DOSE MODO E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE

1 fiala al dì, per via e.v. o i.m.

SOVRADOSAGGIO

Non sono note esperienze di sovradosaggio.

EFFETTI COLLATERALI

Non sono stati osservati effetti collaterali degni di nota nell'uomo. Raramente si possono manifestare reazioni cutanee di tipo aspecifico.

La somministrazione di piridossina deve essere evitata in pazienti che fanno uso di L-dopa.

Se si verificassero effetti collaterali avvertire il medico curante.

CONFEZIONI

Scatola di 3 fiale di prodotto liofilizzato e 3 fiale di solvente per uso intramuscolare.

Scatola di 3 fiale di prodotto liofilizzato e 3 fiale di solvente per uso endovenoso.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE.

Ultima revisione: giugno 2010