

## **LISERDOL 4 mg Compresse rivestite con film** Metergolina

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è LISERDOL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare LISERDOL
3. Come usare LISERDOL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LISERDOL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Che cos'è LISERDOL e a cosa serve**

LISERDOL contiene il principio attivo metergolina, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati Antiserotoninici, che agiscono come inibitore della prolattina. Viene utilizzato per:

- prevenzione e soppressione della produzione di latte dal seno;
- trattamento dell'assenza di mestruazioni quando ciò sia dovuto ad aumento della prolattina;
- emicranie e trattamento preventivo cefalee vascolari; cioè dovute ad alterazioni dei vasi circolatori del cervello;
- sindromi da accelerato transito gastro-intestinale (dumping syndrome) dei gastresecati; diarrea da ipermotilità intestinale;
- rari tumori intestinali (cromaffinomi).

### **2. Cosa deve sapere prima di usare LISERDOL**

#### **Non usi LISERDOL:**

Se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

In caso di gravidanza (vedi "Gravidanza, allattamento e fertilità").

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere LISERDOL. Nelle donne affette da assenza di mestruazioni è opportuno accertare che la sintomatologia e i livelli di prolattina non siano sostenuti da un tumore o da un tumore benigno della ghiandola ipofisi.

Durante il trattamento dell'amenorrea-galattorrea può verificarsi una gravidanza anche senza ricomparsa delle mestruazioni.

Sarà pertanto opportuno, ogni 20 giorni di terapia, eseguire un test di gravidanza. Nelle pazienti invece che non desiderino una

gravidanza dovranno essere adottate misure contraccettive non ormonali. LISERDOL contiene lattosio: in caso di accertata intolleranza agli zuccheri contattare il medico curante prima di assumere il medicinale

### **Altri medicinali e LISERDOL**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza ed allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

in gravidanza usi il prodotto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

. Nel corso di trattamento per sopprimere la lattazione è raccomandabile sospendere l'allattamento al seno fin dal primo giorno di terapia.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

LISERDOL non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **3. Come usare LISERDOL**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Per facilitare l'assorbimento prenda preferibilmente questo medicinale lontano dai pasti.

Per la prevenzione della produzione di latte dal seno: 4 mg per via orale 3 volte al giorno per 7 giorni, a partire dal mattino successivo al parto.

Per la soppressione della produzione di latte dal seno: **la dose raccomandata è 4 mg per via orale 3 volte al giorno per 7 giorni.**

Per il trattamento dell'assenza di mestruazioni quando ciò sia dovuto ad aumento della prolattina (**Amenorree iperprolattinemiche**): **la dose raccomandata è 2 mg per via orale 3 volte al giorno per i primi 3-4 giorni di trattamento, successivamente 4 mg 3 volte al giorno.** Il trattamento dovrà essere protratto fino alla ricomparsa dei flussi mestruali e comunque per non meno di 90 giorni.

**Per le emicranie e cefalee vascolari: la dose raccomandata è 2-8 mg al giorno per via orale in dosi refratte.**

**Per le sindromi da accelerato transito intestinale: la dose raccomandata è 2-4 mg per via orale un'ora e mezzo o due ore prima dei pasti.**

Per rari tumori intestinali (**Cromaffinomi intestinali**): **la dose raccomandata è 4-12 mg per via orale al giorno, in dosi refratte.**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

### **Se usa più LISERDOL di quanto deve:**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Liserdol avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di usare LISERDOL**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza.

## **Se interrompe il trattamento con LISERDOL**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Tali effetti sono generalmente di lieve entità e comprendono più frequentemente nausea, vomito, insonnia, sonnolenza, ansia e vertigini, astenia (stanchezza), disturbi gastrici. Eccezionalmente sono stati segnalati anche casi di calo pressorio arterioso, talora gravi. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare LISERDOL**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Non usi questo medicinale se nota segni visibili di deterioramento

Questo medicinale non richiede alcuna particolare precauzione per la conservazione

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene LISERDOL**

Ogni compressa film-rivestita contiene:  
il principio attivo è metergolina 4 mg.

Gli altri componenti sono sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, povidone, amido di mais, lattosio, titanio diossido (E171), idrossipropilmetilcellulosa, silicone, macrogol 6000.

#### **Descrizione dell'aspetto di LISERDOL e contenuto della confezione**

LISERDOL si presenta in compresse filmate confezionate in un flacone da 30 compresse.

#### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

TEOFARMA Srl

Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

#### **Produttore**

TEOFARMA Srl  
Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

Agenzia Italiana del Farmaco