

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Cardiazol-Paracodina 20 mg/ml + 100 mg/ml gocce orali, soluzione diidrocodaina rodanato / pentetrazolo

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Cardiazol-Paracodina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Cardiazol-Paracodina
3. Come prendere Cardiazol-Paracodina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Cardiazol-Paracodina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Cardiazol-Paracodina e a cosa serve

Cardiazol-Paracodina contiene i principi attivi diidrocodaina rodanato e pentetrazolo, che fanno parte della categoria dei medicinali sedativi della tosse con azione a livello del cervello, in quanto agiscono riducendo lo stimolo della tosse.

Cardiazol-Paracodina si usa come sedativo della tosse.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Cardiazol-Paracodina

NON prenda Cardiazol-Paracodina:

- se è allergico a diidrocodaina rodanato, pentetrazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha gravi problemi al fegato (insufficienza epatica);
- se soffre di problemi respiratori (insufficienza respiratoria);
- se soffre di stitichezza che si protrae per giorni;
- se sta assumendo o ha preso da meno di due settimane medicinali antidepressivi (della classe degli inibitori delle monoaminossidasi);
- se sta assumendo altri medicinali antidolorifici (analgesici-narcotici);
- se soffre di epilessia, anche anamnesticamente;
- se soffre di convulsioni;
- se sta allattando (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento");
- se il paziente è un bambino di età inferiore a 2 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Cardiazol-Paracodina.

Cardiazol-Paracodina può dare assuefazione. Si attenga scrupolosamente alle dosi consigliate.

Si rivolga al medico se è anziano e sta prendendo Cardiazol-Paracodina ad alte dosi e/o per un lungo periodo di tempo, in quanto il medicinale può causare un peggioramento dei sintomi di altre malattie (disturbi cerebrali, difficoltà nell'urinare, etc.).

Bambini

Cardiazol-Paracodina non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 2 anni.

Altri medicinali e Cardiazol-Paracodina

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Gli effetti di Cardiazol-Paracodina sul sistema nervoso centrale sono aumentati da altri farmaci, come:

- sedativi,
- tranquillanti,
- antistaminici.

Il medico la consiglierà per evitare inattesi e indesiderati effetti da interazione. L'uso concomitante di Cardiazol-Paracodina e farmaci sedativi come le benzodiazepine o derivati aumenta il rischio di sonnolenza, difficoltà a respirare (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso per la vita. Per questo motivo, l'uso concomitante deve essere preso in considerazione solo quando non sono possibili altre opzioni di trattamento.

Tuttavia, se il suo medico prescrive Cardiazol-Paracodina insieme ad un altro farmaco sedativo, la dose e la durata del trattamento concomitante devono essere limitate dal suo medico.

Informi il medico di tutti i farmaci sedativi che sta usando e segua scrupolosamente le indicazioni sulla dose fornite dal suo medico. Può essere utile informare parenti e amici di fare attenzione ai segni e ai sintomi sopra indicati. Contatti il suo medico nel caso si presentino questi sintomi.

Cardiazol-Paracodina con alcol

Durante la terapia deve evitare di assumere contemporaneamente alcol.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Se è in corso una gravidanza, il medicinale le sarà prescritto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico, poichè i farmaci come

Cardiazol-Paracodina attraversano la placenta ed è possibile che il neonato abbia problemi respiratori.

Allattamento

Cardiazol-Paracodina non deve essere presodurante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Cardiazol-Paracodina può provocare sonnolenza e ciò può influire sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari o effettuare operazioni che richiedano integrità del grado di vigilanza.

Per chi svolge attività sportiva

L'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare positività ai test anti-doping.

3. Come prendere Cardiazol-Paracodina

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Cardiazol-Paracodina deve essere preso preferibilmente dopo i pasti e non a stomaco vuoto; può essere eventualmente diluito in acqua zuccherata o in succhi di frutta.

Dosi medie (salvo diversa prescrizione medica):

Adulti:	10-15-20 gocce 2-3 volte al giorno
Ragazzi:	1 goccia per ogni anno di età 2-3 volte al giorno
Bambini oltre i 2 anni:	2-5 gocce 2-3 volte al giorno

Uso nei pazienti anziani

Il medico stabilirà il dosaggio per il paziente anziano, valutando una eventuale riduzione delle dosi sopraindicate.


MODALITÀ DI APERTURA DEL FLACONE

Per aprire:

- Appoggiare il flacone su una superficie piana
- Premere la capsula sul flacone e contemporaneamente svitare

Per chiudere:

- Riavvitare la capsula fino in fondo



Se prende più Cardiazol-Paracodina di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Cardiazol-Paracodina avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

I più importanti sintomi di avvelenamento da oppiacei, come diidrocodeina rodanato, sono:

- coma profondo,
- riduzione della frequenza respiratoria,
- caduta della pressione arteriosa,
- restringimento della pupilla (miosi),
- riduzione della produzione di urina,
- caduta della temperatura corporea,
- accumulo di liquidi (edema) nei polmoni.

I sintomi dovuti all'assunzione di una dose eccessiva di pentetrazolo sono:

- depressione della respirazione,
- convulsioni di tipo epilettico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Cardiazol-Paracodina, si rivolga al medico o al farmacista.

Se dimentica di prendere Cardiazol-Paracodina

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Cardiazol-Paracodina

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alle dosi di trattamento gli effetti indesiderati più comuni sono:

- sedazione e/o sonnolenza,
- disturbi gastrointestinali quali nausea, vomito e stitichezza.

Occasionalmente sono stati descritti:

- mal di testa,
- vertigini,
- stanchezza,
- agitazione (in particolare nelle persone anziane).

In persone ipersensibili al farmaco possono verificarsi o peggiorare:

- depressione nervosa,
- problemi respiratori e cardiocircolatori.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Cardiazol-Paracodina

Conservi il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Cardiazol-Paracodina

- I principi attivi sono pentetrazolo e diidrocodina rodanato. 1 ml di soluzione contiene 100 mg di pentetrazolo e 20 mg di diidrocodina rodanato.
- Gli altri componenti sono acqua depurata, essenza menta, polisorbato 80.

Descrizione dell'aspetto di Cardiazol-Paracodina e contenuto della confezione

Cardiazol-Paracodina è una soluzione contenuta in un flacone da 10 ml con contagocce.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

TEOFARMA S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

TEOFARMA S.r.l.
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il