

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Beben Clorossina 0,025% + 0,5% Crema Betametasone/clorossina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Beben Clorossina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Beben Clorossina
3. Come usare Beben Clorossina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Beben Clorossina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Beben Clorossina e a cosa serve

Beben Clorossina crema contiene i principi attivi betametasone e clorossina. Il betametasone usato sulla cute ha attività antiinfiammatoria, antiallergica, vasocostrittrice e aiuta anche a contrastare la formazione del gonfiore causato dall'accumulo di liquidi nel tessuto (attività antiedemigena). La clorossina, invece, è una sostanza usata normalmente per ostacolare o prevenire lo sviluppo delle infezioni della pelle (attività antisettica) causate da batteri e funghi.

Beben Clorossina 0,025% + 0,5% è indicato per:

- le infiammazioni della pelle causate da funghi (eczema micotico) o da agenti che provocano la produzione di pus (eczemi piogenici);
- tutte le malattie della pelle infette (dermatosi infette) o suscettibili di infezione, che rispondono bene alla terapia locale con corticosteroidi.

2. Cosa deve sapere prima di usare Beben Clorossina

NON usi Beben Clorossina

- se è allergico al betametasone e alla clorossina, o a sostanze strettamente simili dal punto di vista chimico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di tubercolosi della pelle o malattie della pelle dovute a virus (in particolare varicella, pustole causate dai vaccini e herpes simplex);

- se è in corso una gravidanza (vedere paragrafo “Gravidanza e allattamento”).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Beben Clorossina.

Faccia particolare attenzione quando Beben Clorossina:

- è applicato su superfici molto ampie della pelle, perché potrebbe causare un maggior assorbimento del principio attivo a livello dell'organismo;
- è usato per un periodo prolungato, perché può causare reazioni allergiche. In questo caso e quando si sviluppano germi resistenti il medico potrà sospendere il trattamento e sostituire Beben Clorossina con una terapia più adatta.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Altri medicinali e Beben Clorossina

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Ad oggi, non sono note interazioni con altri medicinali e incompatibilità.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Sebbene non siano noti effetti negativi dei cortisonici per uso locale in gravidanza, se è in corso una gravidanza il medicinale le sarà prescritto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Informazioni importanti sugli eccipienti

Beben Clorossina crema contiene **alcol cetilico**, **glicole propilenico** (32,4 mg per grammo di crema) e **sodio lauril solfato** (2 mg per grammo di crema).

L'**alcol cetilico** può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Il **glicole propilenico** può causare irritazione cutanea, non lo usi su ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciate) senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Il **sodio lauril solfato** può causare irritazione della pelle (sensazione di pizzicore o bruciore) o intensificare le reazioni sulla pelle causate da altri medicinali quando applicati sulla stessa area.

3. Come usare Beben Clorossina

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi 1-2 volte al giorno una quantità di Beben Clorossina sufficiente a ricoprire la zona malata.

Se possibile e tollerato, può praticare un lieve massaggio della parte trattata ed eventualmente proteggerla con una fasciatura.

Le applicazioni andranno continuate fino a eventuale miglioramento o a completa guarigione a giudizio del medico.

Se usa più Beben Clorossina di quanto deve

In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Beben Clorossina avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio salvo quanto indicato nel paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni".

Se interrompe il trattamento con Beben Clorossina

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il trattamento con corticosteroidi per uso locale può causare:

- sensazione di bruciore, prurito, irritazione, secchezza della pelle;
- infiammazione del follicolo ossia la struttura della pelle in cui cresce il pelo (follicolite);
- aumento della crescita e del numero di peli (ipertricosi);
- lesioni della pelle simili all'acne (eruzioni acneiformi);
- diminuzione della colorazione della pelle (ipopigmentazione);
- rammollimento e degradazione della pelle a causa di alte quantità di liquido accumulate sulla pelle (macerazione della pelle);
- assottigliamento della pelle e comparsa di smagliature (atrofia della pelle e strie atrofiche);
- visione offuscata con una frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Beben Clorossina

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Beben Clorossina

- I principi attivi sono betametasone 17-benzoato e clorossina. 100 g di Beben Clorossina crema contengono 0,025 g di betametasone e 0,5 g di clorossina.
- Gli altri componenti sono vaselina bianca, paraffina liquida, polawax, alcool cetilico, polietilenglicole 6000, isopropile stearato, glicole propilenico, sodio laurilsolfato, acido citrico monoidrato, trietanolammina, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Beben Clorossina e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene un tubo da 30 g di crema allo 0,025% di betametasone 17-benzoato e 0,5% di clorossina.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teofarma S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

Teofarma S.r.l.
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il xxx

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Beben Clorossina 0,1% + 0,5% Crema Beben Clorossina 0,1% + 0,5% Emulsione cutanea Betametasona/clorossina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Beben Clorossina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Beben Clorossina
3. Come usare Beben Clorossina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Beben Clorossina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Beben Clorossina e a cosa serve

Beben Clorossina crema ed emulsione cutanea contengono i principi attivi betametasona e clorossina.

Il betametasona usato sulla cute ha attività antiinfiammatoria, antiallergica, vasocostrittrice e aiuta anche a contrastare la formazione del gonfiore causato dall'accumulo di liquidi nel tessuto (attività antiedemigena). La clorossina, invece, è una sostanza usata normalmente per ostacolare o prevenire lo sviluppo delle infezioni della pelle (attività antisettica) causate da batteri e funghi.

Beben-Clorossina è indicato in tutte le dermatosi di natura infiammatoria e allergica che possono trarre beneficio dal trattamento locale con cortisonici e in cui sia presente, o si voglia prevenire, una infezione batterica o fungina.

In particolare per:

- le infiammazioni della pelle causate da funghi (eczema micotico) o da agenti che provocano la produzione di pus (eczemi piogenici);
- intertrigine, le lesioni localizzate nelle pieghe della pelle;
- tutte le malattie della pelle infette (dermatosi infette) o suscettibili di infezione, che rispondono bene alla terapia locale con corticosteroidi.

2. Cosa deve sapere prima di usare Beben Clorossina

NON usi Beben Clorossina

- se è allergico al betametasone e alla clorossina, o a sostanze strettamente simili dal punto di vista chimico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di tubercolosi della pelle o malattie della pelle dovute a virus (in particolare varicella, pustole causate dai vaccini e herpes simplex);
- se ha una malattia infiammatoria caratterizzata da rossore, vesciche piene di liquido, macchie e ispessimento della pelle (acne rosacea), lesioni della pelle che non cicatrizzano (ulcere cutanee);
- se è in corso una gravidanza (vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Beben Clorossina.

Faccia particolare attenzione quando Beben Clorossina:

- è applicato su superfici molto ampie della pelle, perché potrebbe causare un maggior assorbimento del principio attivo a livello dell'organismo;
- è usato per un periodo prolungato, perché può causare reazioni allergiche. In questo caso e quando si sviluppano germi resistenti il medico potrà sospendere il trattamento e sostituire Beben Clorossina con una terapia più adatta.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Bambini

Nella primissima infanzia il prodotto va usato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

Altri medicinali e Beben Clorossina

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Ad oggi, non sono note interazioni con altri medicinali e incompatibilità.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Sebbene non siano noti effetti negativi dei cortisonici per uso locale in gravidanza, se è in corso una gravidanza il medicinale le sarà prescritto solo nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Informazioni importanti sugli eccipienti

Beben Clorossina crema contiene alcol cetilico e glicole propilenico (250 mg per grammo di crema).

Beben Clorossina emulsione cutanea contiene alcol cetilico, glicole propilenico (20 mg per ml di emulsione) e sodio lauril solfato (2 mg per ml di emulsione).

L'**alcol cetilico** può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto).

Il **glicole propilenico** può causare irritazione cutanea, non lo usi su ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciate) senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Il **sodio lauril solfato** può causare irritazione della pelle (sensazione di pizzicore o bruciore) o intensificare le reazioni sulla pelle causate da altri medicinali quando applicati sulla stessa area.

3. Come usare Beben Clorossina

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi una sola volta al giorno una quantità di Beben Clorossina sufficiente a ricoprire la zona malata.

Beben Clorossina è disponibile in crema ed emulsione cutanea, il medico valuterà quale di queste preparazioni è più adatta alla sua condizione.

Beben Clorossina 0,1% + 0,5% crema è indicata nelle:

- dermatiti acute secernenti, ovvero malattie della pelle con produzione di liquido;
- dermatiti subacute-croniche secche, ossia infiammazioni della pelle a lenta guarigione e di intensità moderata.

Beben Clorossina 0,1% + 0,5% emulsione cutanea deve essere agitata leggermente prima di essere usata ed è indicata per le dermatosi delle zone ricoperte da peli.

Se possibile e tollerato, può praticare un lieve massaggio della parte trattata ed eventualmente proteggerla con una fasciatura.

Le applicazioni andranno continuate fino a eventuale miglioramento o a completa guarigione a giudizio del medico.

Se usa più Beben Clorossina di quanto deve

In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Beben Clorossina, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se interrompe il trattamento con Beben Clorossina

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il trattamento con corticosteroidi per uso locale può causare:

- sensazione di bruciore, prurito, irritazione, secchezza della pelle;
- infiammazione del follicolo, ossia la struttura della pelle in cui cresce il pelo (follicolite);
- aumento della crescita e del numero di peli (ipertricosi);
- lesioni della pelle simili all'acne (eruzioni acneiformi);
- diminuzione della colorazione della pelle (ipopigmentazione);
- rammollimento e degradazione della pelle a causa di alte quantità di liquido accumulate sulla pelle (macerazione della pelle);
- assottigliamento della pelle e comparsa di smagliature (atrofia della pelle e strie atrofiche).
- visione offuscata con una frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Beben Clorossina

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Beben Clorossina

Beben Clorossina 0,1% +0,5% crema

- I principi attivi sono betametasone 17-benzoato e clorossina. 100 g di Beben Clorossina crema contengono 0,1 g di betametasone e 0,5 g di clorossina.
- Gli altri componenti sono disodio monooleoamido solfosuccinato, glicerile monostearato, glicole propilenico, alcool cetilico, paraffina liquida, acido citrico monoidrato, edetato disodico, acqua depurata.

Beben Clorossina 0,1% + 0,5% emulsione cutanea

- I principi attivi sono betametasone 17-benzoato e clorossina. 100 g di Beben Clorossina emulsione cutanea contengono 0,1 g di betametasone e 0,5 g di clorossina.
- Gli altri componenti sono polawax A 31, alcool cetilico, glicole propilenico, sodio laurilsolfato, tocoferoli misti, acido citrico monoidrato, trietanolamina, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Beben Clorossina e contenuto della confezione

Beben Clorossina 0,1% +0,5% crema

Ogni confezione contiene un tubo da 30 g di crema allo 0,1% di betametasone 17-benzoato e 0,5% di clorossina.

Beben Clorossina 0,1% + 0,5% emulsione cutanea

Ogni confezione contiene un flacone da 30 ml di emulsione cutanea allo 0,1% di betametasone 17-benzoato e 0,5% di clorossina.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teofarma S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

Teofarma S.r.l.
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il xxx