

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Urotractin 400 mg capsule rigide Urotractin 200 mg capsule rigide acido pipemidico

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Urotractin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Urotractin
3. Come prendere Urotractin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Urotractin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Urotractin e a cosa serve

Urotractin contiene il principio attivo acido pipemidico, un antibatterico che appartiene alla categoria dei farmaci noti come chinoloni. L'acido pipemidico agisce uccidendo i batteri che provocano infezioni del tratto urinario.

Urotractin si usa per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie, come le infiammazioni della vescica, dei reni, della prostata e in generale dell'apparato urinario, struttura dell'organismo destinata alla raccolta ed eliminazione dell'urina (cistiti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti, uretriti, prostatiti, ecc).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Urotractin

NON prenda Urotractin

- se è allergico all'acido pipemidico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è un bambino.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Urotractin.

Se sta prendendo Urotractin, deve ridurre il tempo di esposizione al sole perchè c'è il rischio che la sua pelle sia più sensibile ai raggi solari e che si presenti una malattia della pelle con formazione di bolle (dermatite bollosa).

Altri medicinali e Urotractin

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non prenda Urotractin contemporaneamente a eritromicina (un antibiotico), perché si può verificare una malattia della coagulazione del sangue nota come porpora trombocitopenica.

Ad oggi non sono state segnalate interazioni di Urotractin con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Urotractin deve essere usato durante la gravidanza solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Urotractin non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come prendere Urotractin

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 400 mg (1 capsula da 400 mg o 2 capsule da 200 mg) due volte al giorno a distanza di 12 ore, preferibilmente dopo i pasti.

Per evitare il rischio di ricadute, prenda Urotractin per almeno 10 giorni o secondo quanto prescritto dal medico, visto che Urotractin può essere assunto anche per un lungo periodo di tempo senza inconvenienti.

Se prende più Urotractin di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Urotractin, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Ad oggi non sono stati descritti sintomi dovuti all'assunzione di una dose eccessiva nell'uomo.

Se dimentica di prendere Urotractin

Assuma la dose appena se ne ricorda a meno che non sia vicina l'ora della dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Urotractin

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati che non richiedono in genere la sospensione del trattamento e che si riducono prendendo il farmaco a stomaco pieno:

- nausea,
- dolore allo stomaco (gastralgia).

Altri effetti indesiderati:

- raramente reazioni a carico della pelle (esantema o orticaria),
- eccezionalmente problemi a livello mentale e dei sensi con vertigini e disturbi dell'equilibrio in soggetti anziani.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Urotractin

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Urotractin

Urotractin 400 mg capsule rigide

- Il principio attivo è acido pipemidico. Ogni capsula rigida contiene 400 mg di acido pipemidico.

- Gli altri componenti sono talco, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato, amido, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), ferro ossido giallo (E172).

Urotractin 200 mg capsule rigide

- Il principio attivo è acido pipemidico. Ogni capsula rigida contiene 200 mg di acido pipemidico.

Gli altri componenti sono talco, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato, amido, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

Descrizione dell'aspetto di Urotractin e contenuto della confezione

Urotractin 400 mg capsule rigide

Ogni confezione contiene 20 capsule rigide da 400 mg.

Urotractin 200 mg capsule rigide

Ogni confezione contiene 20 capsule rigide da 200 mg.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

TEOFARMA S.r.l.

Via F.lli Cervi, 8

27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

TEOFARMA S.r.l.

Viale Certosa, 8/A

27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il