

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Tationil 600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile

Glutazione

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Tationil e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Tationil
3. Come prendere Tationil
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Tationil
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Tationil e a cosa serve

Tationil è utilizzato negli adulti per prevenire malattie che colpiscono uno o più nervi in seguito al trattamento con cisplatino (farmaco utilizzato per la cura dei tumori) o analoghi.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Tationil

Non prenda Tationil

- se è allergico al glutatione o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Tationil.

Bambini e adolescenti

Non è indicato l'uso di Tationil nei bambini e negli adolescenti poiché sicurezza ed efficacia non sono state stabilite in questo gruppo di pazienti.

Altri medicinali e Tationil

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso di una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. Sebbene la ricerca sperimentale non abbia evidenziato per il glutatone tossicità embrio-fetale, come per tutti i nuovi farmaci non se ne consiglia l'impiego in gravidanza e durante l'allattamento

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Tationil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come prendere Tationil

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1-2 flaconcini al giorno.

Può essere somministrato in un muscolo (via intramuscolare), in una vena (via endovenosa lenta o aggiunti a fleboclisi) o secondo diversa prescrizione medica.

Se prende più Tationil di quanto deve

In caso di sovradosaggio, si rivolga immediatamente al suo medico, o raggiunga il più vicino ospedale, dove provvederanno ad assicurarle le cure adeguate.

Se dimentica di prendere Tationil

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Tationil

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con Tationil potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati che scompaiono sospendendo la terapia:

Effetti che riguardano la pelle:

- eruzioni della pelle

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Tationil

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Tationil

- Il principio attivo è: Glutazione (sale sodico) 600 mg
- L'altro componente è: acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione dell'aspetto di Tationil e contenuto della confezione

Tationil si presenta in flaconcini contenenti una polvere bianca e in fiale contenenti una soluzione iniettabile limpida e incolore. È disponibile nella seguente confezione: 10 flaconcini di polvere da 600 mg e 10 fiale di solvente da 4 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Teofarma S.r.l.

Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV).

Produttore

Teofarma S.r.l.

Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Volturno, 48

20089 Quinto de' Stampi – Rozzano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il