

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CI-AGRO

Vitamina C

COMPOSIZIONE

Ci-Agro 500 mg compresse masticabili - 20 cpr gusto arancia: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico (Vitamina C) 515 mg corrispondente a 500 mg di acido ascorbico. Eccipienti: saccarosio CD, palmitato stearato di glicerolo, sodio ciclamato, magnesio stearato, aroma di arancia, aroma tutti i frutti, giallo arancia S E110 lacca.

Ci-Agro 500 mg compresse masticabili - 20 cpr gusto limone: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico (Vitamina C) 515 mg corrispondente a 500 mg di acido ascorbico. Eccipienti: Saccarosio CD, palmitato stearato di glicerolo, sodio ciclamato, magnesio stearato, aroma limone, giallo chinolina S E104 lacca.

Ci-Agro 250 mg compresse masticabili - 20 cpr gusto arancia: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico ricoperto (Vitamina C) 257,5 mg (pari a 250 mg di acido ascorbico) Eccipienti: Saccarosio CD, palmitato stearato di glicerolo, sodio ciclamato, magnesio stearato, aroma tutti frutti, Giallo arancio S E110 lacca, aroma arancio.

Ci-Agro 500 mg compresse masticabili - 20 cpr senza zucchero: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico ricoperto (Vitamina C) 257,5 mg (pari a 250 mg di acido ascorbico); sodio ascorbato 281 mg (pari a 250 mg di acido ascorbico). Eccipienti: Sorbite, palmitato stearato di glicerolo, silice precipitata, magnesio stearato, sodio ciclamato, aroma mandarino, aroma arancio, Giallo arancio S E110 lacca.

Ci-Agro 1 g compresse effervescenti tubo 10 compresse effervescenti gusto arancia: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico (Vitamina C) 1 g; Eccipienti: Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio ciclamato, aroma arancio, acido adipico, Giallo arancio S E110 lacca, Giallo arancio S E110, saccarosio, saccarosio CD.

Ci-Agro 1 g compresse effervescenti tubo 10 compresse effervescenti gusto limone: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico (Vitamina C) 1 g; Eccipienti: Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio ciclamato, aroma limone, acido adipico, Giallo chinolina E104 lacca, Giallo chinolina E104, saccarosio, saccarosio CD

Ci-Agro 1 g compresse effervescenti tubo 10 compresse senza zucchero: una compressa contiene principio attivo: acido ascorbico (Vitamina C) 1 g; Eccipienti: acido tartarico ricoperto, sodio bicarbonato, sorbite granulata, aroma arancio, acido adipico, sodio ciclamato, saccarina sodica, silice colloidale anidra, Giallo arancio S E110.

COME SI PRESENTA

Ci-Agro si presenta in forma di compresse masticabili o di compresse effervescenti per uso orale.

Il contenuto della confezione è:

- Ci-Agro** 500 mg arancia: 20 compresse masticabili
- Ci-Agro** 500 mg limone: 20 compresse masticabili
- Ci-Agro** 250 mg arancia: 20 compresse masticabili
- Ci-Agro** 500 mg senza zucchero: 20 compresse masticabili
- Ci-Agro** 1 g arancia: 10 compresse effervescenti
- Ci-Agro** 1 g limone: 10 compresse effervescenti
- Ci-Agro** 1 g senza zucchero: 10 compresse effervescenti

CHE COSA È

Ci-Agro è Vitamina C.

TITOLARE A.I.C:

Bracco Imaging S.p.A. Via Folli, 50 - Milano

Produttore

E-PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, 38040 Ravina, (TN) Italia

PERCHÉ SI USA

Ci-Agro si usa per gli stati carenziali di Vitamina C.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere il consiglio del medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

La vitamina C deve essere usata con cautela da soggetti che soffrano, o abbiano sofferto in passato, di nefrolitiasi (calcolosi renale) e da quelli affetti da Deficit di G6PD (Glucosio-6-fosfato deidrogenasi), emocromatosi, talassemia o anemia sideroblastica.

I soggetti che soffrono di diabete o che seguono diete ipocaloriche devono tenere conto che:

| CONFEZIONE | CONTENUTO SACCAROSIO |
|---|----------------------|
| 250 mg compresse masticabili arancia | ~1462 mg |
| 500 mg compresse masticabili limone e arancia | ~1200 mg |
| 1 g compresse effervescenti limone e arancia | ~ 809 mg |

I soggetti che seguono regimi dietetici poveri di sodio devono tenere conto che:

| CONFEZIONE | CONTENUTO SODIO | CONTENUTO SALE DA CUCINA |
|---|-----------------|--------------------------|
| 250 mg compresse masticabili arancia e limone | 3 mg | 7 mg |

| | | |
|---|--------|--------|
| 500 mg compresse masticabili arancia e limone | 3.5 mg | 9 mg |
| 500 mg compresse masticabili senza zucchero | 35 mg | 89 mg |
| 1 g compresse effervescenti senza zucchero | 285 mg | 724 mg |
| 1 g compresse effervescenti limone e arancia | 285 mg | 724 mg |
| | | |

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

L'acido ascorbico può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni tests diagnostici, in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici. E' perciò consigliabile sospendere l'assunzione di vitamina C alcuni giorni prima di procedere a tale esame.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

QUANTO

Compresse masticabili

Ci-Agro compresse masticabili da 250 mg va assunto in dose di 1-4 compresse al giorno.

Ci-Agro compresse masticabili da 500 mg va assunto in dose di 1-2 compresse al giorno.

In casi gravi, in cui sia necessario compensare un intenso stato di carenza di Vitamina C, può essere necessaria l'assunzione di più compresse al giorno.

Compresse effervescenti

Ci-Agro compresse effervescenti da 1 g va assunto in dose di 1 compressa al giorno

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

COME

Compresse masticabili

Le compresse sono masticabili ma possono anche essere sciolte lentamente in bocca od ingerite, dopo averle rotte, con un po' di acqua, tè o succo di frutta

Compresse effervescenti

La compressa si scioglie in mezzo bicchiere d'acqua o di succo di frutta e si beve subito dopo il completo scioglimento.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Ci-Agro avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Somministrazioni di quantità molto elevate possono occasionalmente determinare leggeri disturbi gastrointestinali, costituiti principalmente da fenomeni di tipo lassativo. In tali casi è opportuno interrompere il trattamento.

EFFETTI INDESIDERATI

In soggetti predisposti possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità.

A dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti mal di testa e disturbi gastro-intestinali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Per quanto riguarda Ci-Agro compresse effervescenti il preparato è sensibile all'umidità. Nel tappo del tubetto è contenuta una sostanza essiccante che serve per proteggere le compresse dall'umidità che vi potrebbe penetrare; pertanto la confezione deve essere ogni volta accuratamente richiusa.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'AIFA: febbraio 2010

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

Ci-Agro[®]
Vitamina C
Granulato effervescente 1 g

Denominazione del medicinale

Ci-Agro[®] Vitamina C - Granulato effervescente 1 g

Composizione

Una bustina da g 4,5 di granulato contiene:

Principio attivo: Acido Ascorbico g 1.

Eccipienti: acido tartarico, sodio bicarbonato, sodio saccarinato, lattosio, amido, saccarosio, aroma naturale di arancia, colorante E 110.

Come si presenta

Ci-Agro[®] si presenta in forma di granulato effervescente. Il contenuto della confezione è di 10 bustine da 1 g.

Che cosa è

Ci-Agro[®] è Vitamina C.

Titolare A.I.C.:

Dibra S.p.A. - Piazza Velasca 5 - Milano

Produttore e responsabile del controllo:

Bracco s.p.a. - Via E. Folli, 50 - Milano

Perché si usa

Ci-Agro[®] si usa in tutti i casi di carenza di Vitamina C.

Quando non deve essere usato

Ci-Agro[®] non deve essere usato nei casi di ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

La Vitamina C può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni tests diagnostici (in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici).

Come usare questo medicinale

Quanto e come

Adulti: il contenuto di 1-2 bustine al giorno sciolto in acqua.

Bambini: 1/4 - 1/2 bustina al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Ci-Agro[®] avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

A dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti mal di testa e disturbi gastrointestinali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

Scadenza e conservazione

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità: Giugno 2000