FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

LEVOFLOXACINA GET 250 mg compresse rivestite con film LEVOFLOXACINA GET 500 mg compresse rivestite con film

Levofloxacina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Contenuto di questo foglio:

- 1. Che cos'è LEVOFLOXACINA GET compresse e a che cosa serve
- 2. Prima di prendere LEVOFLOXACINA GET compresse
- 3. Come prendere LEVOFLOXACINA GET compresse
- 4. Possibili effetti indesiderati
- 5. Come conservare LEVOFLOXACINA GET compresse
- 6. Altre informazioni

1. CHE COS'È LEVOFLOXACINA GET COMPRESSE E A CHE COSA SERVE

Il nome di questo medicinale è Levofloxacina GET compresse. Levofloxacina GET compresse contiene un principio attivo chiamato levofloxacina. Questo medicinale appartiene al gruppo dei medicinali chiamati antibiotici. Levofloxacina è un antibiotico "chinolonico". Questo medicinale agisce uccidendo i batteri responsabili delle infezioni nell'organismo.

LEVOFLOXACINA GET compresse può essere utilizzato per il trattamento delle infezioni:

- dei seni facciali
- dei polmoni, in pazienti affetti da problemi respiratori cronici o da polmonite
- delle vie urinarie, inclusi reni e vescica
- della prostata, dove può svilupparsi un'infezione persistente
- della pelle e del tessuto sottocutaneo, inclusi i muscoli. Questi vengono chiamati, a volte, "tessuti molli".

2. PRIMA DI PRENDERE LEVOFLOXACINA GET COMPRESSE

Non prenda questo medicinale e informi il medico se:

- è allergico (ipersensibile) alla levofloxacina, a qualsiasi altro antibiotico chinolonico come moxifloxacina, ciprofloxacina o ofloxacina o ad un qualsiasi degli eccipienti di Levofloxacina GET compresse (elencati al paragrafo 6)
 - I segni di una reazione allergica comprendono: rash, problemi di deglutizione o respiratori, gonfiore delle labbra, del volto, della gola o della lingua
- soffre o ha sofferto di epilessia
- ha avuto problemi a carico dei tendini, come la tendinite, correlati al trattamento con un "antibiotico chinolonico". I tendini sono delle strutture fibrose che uniscono i muscoli dello scheletro
- è un bambino o un adolescente nel periodo della crescita
- è in gravidanza, potrebbe rimanere incinta o pensa di esserlo
- sta allattando

Non prenda questo medicinale se quanto sopra può in qualche modo riguardarla. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Levofloxacina GET compresse.

Faccia particolare attenzione con LEVOFLOXACINA GET compresse

- nei casi più gravi di polmonite provocata da certi patogeni (per es. S. pneumoniae), chieda consiglio al medico in quanto Levofloxacina GET potrebbe non essere la terapia ottimale.
- nelle infezioni contratte in ambiente ospedaliero causate da certi patogeni (per es. P. aeruginosa). Consulti il medico in quanto queste possono richiedere una terapia associata.
- nelle infezioni causate da certi patogeni (S. aureus resistente alla meticillina MRSA). Consulti il medico in quanto queste possono richiedere una terapia associata.
- se le viene un'infiammazione tendinea (tendinite) durante il trattamento con Levofloxacina GET. Questa coinvolge nella maggior parte dei casi il tendine di Achille e e può portare alla sua rottura. Il rischio di tendinite e di rotture tendinee è aumentato nei pazienti anziani e nei pazienti che utilizzano corticosteroidi. All'insorgenza di sintomi di tendinite (per es. disturbi tendinei) si rivolga immediatamente al medico. Smetta di assumere Levofloxacina GET e inizi un trattamento per il tendine colpito, per es. metta a riposo la parte colpita (si veda anche paragrafo "Non prenda levofloxacina compresse" e "Possibili effetti indesiderati".
- se ha diarrea grave, persistente e/o sanguinosa durante e dopo il trattamento con Levofloxacina GET. Informi immediatamente il medico, in quanto questa diarrea può essere sintomo di una grave infiammazione intestinale (enterocolite) che può sopravvenire a seguito del trattamento con l'antibiotico. Smetta di assumere Levofloxacina GET. Il medico le cambierà trattamento. Non prenda farmaci antidiarroici che rallentano i movimenti intestinali. Per questo consulti il medico o il farmacista.
- se ha maggiore predisposizione a convulsioni. Durante il trattamento con Levofloxacina GET il rischio di attacchi epilettici può essere maggiore se in passato ha subito danni cerebrali come un colpo apoplettico o gravi ferite al cervello. Deve informare il medico se ha subito in passato tali eventi. Non deve prendere le compresse se soffre di epilessia.

Anche la tendenza ai crampi può essere maggiore durante un trattamento concomitante con teofillina, con fenbufene e altri farmaci antiinfiammatori non steroidei usati per il dolore e l'infiammazione come aspirina, ibuprofene, ketoprofene e indometacina (si veda anche "Uso di altri medicinali"). Qualora si verificassero convulsioni, il trattamento deve essere sospeso.

- se soffre di una malattia conosciuta come "carenza della glucosio-6-fosfato-deidrogenasi". La somministrazione di questo medicinale rende più probabile lo sviluppo di problemi gravi a carico del sangue
- se soffre di deficit renale. Chieda al medico come la dose debba essere adattata (si veda il paragrafo "Come prendere Levofloxacina GET compresse").
- se sopravvengono gravi reazioni allergiche (ipersensibilità) (talvolta anche a seguito della dose iniziale). Si rivolga immediatamente al medico o al più vicino ospedale. Smetta il trattamento con Levofloxacina GET compresse.
- se ha il diabete e fa uso di ipoglicemizzanti orali o di insulina. E' necessario monitorare attentamente i livelli di zucchero nel sangue, in quanto i livelli glicemici possono abbassarsi troppo (vedere anche paragrafo "Uso di altri medicinali").
- se ha un'esposizione alla luce solare o a raggi ultravioletti. La fotosensibilizzazione (ipersensibilità alla luce con reazioni simili alle scottature solari) è un evento raro con la levofloxacina. Comunque si raccomanda di evitare l'esposizione superflua alla luce del sole forte o a raggi ultravioletti artificiali (per es. lampade solari, solarium) per prevenire la fotosensibilizzazione.
- se ha sofferto di problemi mentali (soffre di psicosi o ha precedentemente sofferto di malattia psichiatrica). Reazioni psicotiche sono state segnalate in pazienti trattati con chinoloni, compresa la levofloxacina. In casi molto rari le stesse hanno una progressione verso pensieri suicidari e comportamenti autolesionistici, talvolta dopo una singola dose di levofloxacina.
- se è a rischio di disturbi della funzione cardiaca (prolungamento dell'intervallo QT). Questo può succedere negli anziani e nelle persone con squilibrio elettrolitico o alcune malattie cardiache (insufficienza cardiaca, infarto del miocardio, bradicardia, allungamento congenito dell'intervallo QT). Il rischio viene accresciuto se utilizza contemporaneamente farmaci che notoriamente prolungano l'intervallo QT come i medicinali contro i disturbi del ritmo cardiaco (antiaritmici di

classe IA e III), i disturbi mentali (antidepressivi triciclici, antipsicotici) e le infezioni (macrolidi).-se ha dei sintomi da lesione nervosa come, per esempio, disturbi sensoriali alla mani e ai piedi. In tal caso consulti immediatamente il medico. Sospenda Levofloxacina GET compresse per prevenire possibili danni.

- se ha sintomi di malattia epatica come, per esempio, ittero, urina scura, prurito, perdita di appetito (anoressia) e addome molle.
- se soffre di Myastenia gravis

Problemi cardiaci

Si deve prestare particolare attenzione quando si usa questo tipo di medicine, se è nato con o ha una storia familiare di intervallo QT prolungato (visualizzato all' ECG, una registrazione elettrica del cuore), ha uno squilibrio salino nel sangue (specialmente un basso livello di potassio o magnesio nel sangue), ha un ritmo del cuore molto lento (chiamato bradicardia), ha un cuore debole (insufficienza cardiaca), ha una storia di attacco di cuore (infarto del miocardio), se è una donna o un paziente anziano o se o sta assumendo altri medicinali che possono provocare cambiamenti anormali all' ECG (vedere sezione Assunzione con altri medicinali).

Bambini

I bambini o gli adolescenti in fase di crescita non devono prendere Levofloxacina GET compresse in quanto il rischio di danno ai tessuti delle articolazioni non può essere escluso.

Anziani

In questo gruppo si riscontra frequentemente un deficit a livello renale. Chieda al medico, in quanto può essere necessario un adattamento della dose (vedere paragrafo "come prendere Levofloxacina GET compresse").

Se ha qualsiasi dubbio che quanto sopra possa in qualche modo riguardarla, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Levofloxacina GET compresse.

Assunzione di LEVOFLOXACINA GET compresse con altri medicinali

Deve informare il medico se sta assumendo altri medicinali che possono alterare il ritmo cardiaco: medicinali che appartengono al gruppo degli antiaritmici (per esempio chinidina, idrochinidina, disopiramide, amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibutilide), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (che appartengono alla classe dei macrolidi), alcuni antipsicotici.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica, inclusi i fitoterapici. Ciò perché LEVOFLOXACINA GET compresse può influire sul meccanismo d'azione di altri medicinali. Anche alcuni medicinali possono influire sul meccanismo d'azione di Levofloxacina GET compresse.

In particolare, informi il medico se sta prendendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali. Questo perché la somministrazione concomitante di LEVOFLOXACINA GET compresse può aumentare la possibilità che lei manifesti effetti indesiderati:

- corticosteroidi a volte chiamati steroidi utilizzati per il trattamento delle infiammazioni. La possibilità che lei sviluppi un'infiammazione e/o la rottura dei tendini è maggiore.
- antagonisti della viatamina K, per esempio warfarin utilizzato per fluidificare il sangue. La
 possibilità che lei manifesti un'emorragia è maggiore. Il medico può chiederle di eseguire
 regolarmente degli esami del sangue per controllare la coagulazione del sangue.
- teofillina utilizzata per problemi respiratori. La possibilità che lei manifesti una crisi (accesso epilettico) è maggiore se lei assume teofillina in associazione con Levofloxacina GET compresse.
- farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) usati per il dolore e l'infiammazione come l'aspirina, l'ipubrofen, il fenbufene, il ketoprofene e l'indometacina. La possibilità che lei manifesti una crisi (accesso epilettico) se presi in associazione con Levofloxacina GET compresse è maggiore.
- ciclosporina utilizzata per i trapianti d'organo. La possibilità che lei manifesti gli effetti indesiderati tipici della ciclosporina è maggiore.

- medicinali noti per i loro effetti sul battito cardiaco. Questi includono i medicinali utilizzati per
 trattare il ritmo cardiaco anormale (antiaritmici quali la chinidina, l'idrochinidina, la
 disopiramide, l'amiodarone, il sotalolo, la dofetilide e l'ibutilide), per la depressione
 (antidepressivi triciclici quali l'amitriptilina e l'imipramina), per le infezioni batteriche
 (antibiotici "macrolidi" quali l'eritromicina, l'azitromicina e la claritromicina), gli antipsicotici.
- probenecid utilizzato per trattare la gotta e cimetidina utilizzata per le ulcere e i bruciori di stomaco. Si deve prestare particolare attenzione nell'utilizzo di uno qualsiasi di questi medicinali in associazione con Levofloxacina GET. Se soffre di problemi ai reni, il medico può prescriverle un dosaggio inferiore.
- insulina o ipoglicemizzanti orali come la glibenclamide. E' necessario monitorare attentamente i suoi livelli di zucchero nel sangue, in quanto i suoi livelli glicemici possono abbassarsi troppo. I sintomi possono consistere in: appetito vorace, nervosismo, sudorazione, tremore.

Non prenda LEVOFLOXACINA GET compresse in concomitanza con i seguenti medicinali. Questo perché il meccanismo di azione di LEVOFLOXACINA GET compresse potrebbe esserne influenzato:

• sali di ferro in compresse (per l'anemia), antiacidi contenenti magnesio o alluminio (per l'acidità o i bruciori di stomaco) o sucralfato (per le ulcere gastriche). Vedere paragrafo 3 "Se sta assumendo sali di ferro in compresse, antiacidi o sucralfato".

Esame delle urine per oppiacei

Nei pazienti che assumono Levofloxacina GET compresse gli esami delle urine possono dare risultati "falso-positivi" per forti antidolorifici chiamati "oppiacei". Se il medico ritiene necessario farle eseguire degli esami delle urine, lo informi che sta prendendo Levofloxacina GET compresse.

Assunzione di LEVOFLOXACINA GET con cibo e bevande

Levofloxacina GET può essere assunto con o senza cibo. Non beva alcool durante il trattamento con Levofloxacina GET.

Gravidanza e allattamento

Non prenda questo medicinale se:

- è in gravidanza, può rimanere incinta o pensa di esserlo
- sta allattando o pensa di allattare

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale se è in gravidanza o se sta allattando.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Alcuni effetti indesiderati possono manifestarsi dopo l'assunzione di questo medicinale che includono capogiri, sonnolenza, sensazione soggettiva di movimento (vertigine) o disturbi visivi. Alcuni di questi effetti indesiderati possono alterare la capacità di concentrazione e la velocità di reazione. Se ciò accade, non guidi veicoli o non svolga attività che richiedono un livello di attenzione elevato.

3. COME PRENDERE LEVOFLOXACINA GET compresse

Prenda sempre Levofloxacina GET seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi deve consultare il medico.

Come prendere questo medicinale

- prenda questo medicinale per bocca
- ingerisca le compresse intere con dell'acqua
- le compresse possono essere assunte durante i pasti o in qualsiasi momento nell'intervallo tra i pasti

Protegga la pelle dalla luce solare

Non si esponga alla luce solare diretta durante il trattamento con questo medicinale. Questo perché la pelle diventerà molto più sensibile al sole e può scottarsi, prudere o possono manifestarsi delle lesioni gravi, se non osserva le seguenti precauzioni:

- si assicuri di usare una crema solare ad alto fattore di protezione
- indossi sempre un cappello e degli indumenti che coprano le braccia e le gambe
- eviti lettini solari

Se sta già assumendo sali di ferro in compresse, antiacidi o sucralfato

• Non prenda questi medicinali in concomitanza con Levofloxacina GET. Prenda la dose prescritta di questi medicinali almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di Levofloxacina GET compresse.

Quanto medicinale prendere

- il medico deciderà quanto Levofloxacina GET compresse deve prendere
- la dose dipenderà dal tipo di infezione cha ha contratto e dalla localizzazione dell'infezione nell'organismo
- la durata del trattamento dipenderà dalla gravità dell'infezione
- se ritiene che l'effetto del medicinale sia troppo debole o troppo forte, non cambi il dosaggio da solo ma si rivolga al medico

Adulti e anziani

Seni facciali

- due compresse di Levofloxacina GET 250 mg una volta al giorno
 - o, una compressa di Levofloxacina GET 500 mg una volta al giorno

Polmoni, in pazienti con problemi respiratori cronici

- una o due compresse di Levofloxacina GET 250 mg una volta al giorno
 - o, mezza compressa o una compressa di Levofloxacina GET 500 mg una volta al giorno

Polmonite

- due compresse di Levofloxacina GET 250 mg una volta o due volte al giorno
 - o, una compressa di Levofloxacina GET 500 mg una volta o due volte al giorno

Vie urinarie inclusi reni o vescica

- una compressa di Levofloxacina GET 250 mg ogni giorno
 - o, mezza compressa di Levofloxacina GET 500 mg ogni giorno

Prostata

- due compresse di Levofloxacina GET 250 mg una volta al giorno
 - o, una compressa di Levofloxacina GET 500 mg una volta al giorno

Pelle e tessuto sottocutaneo, inclusi i muscoli

- una o due compresse di Levofloxacina GET 250 mg una volta o due volte al giorno
 - o, mezza compressa o una compressa di Levofloxacina GET 500 mg una volta o due volte al giorno

Adulti con problemi ai reni

Il medico può ritenere necessario diminuire il dosaggio.

Bambini e adolescenti

Questo medicinale non deve essere somministrato a bambini o adolescenti.

Se prende più LEVOFLOXACINA GET compresse di quanto deve

Se prende accidentalmente più compresse di quanto deve, informi immediatamente il medico o chieda altrove un parere medico. Porti con sé la confezione del medicinale. Ciò permetterà al medico di sapere cosa ha preso. Si potranno manifestare i seguenti effetti indesiderati: crisi convulsive (accesso epilettico), stato confusionale, capogiri, sensazione di svenimento e problemi cardiaci – che possono portare a battiti cardiaci irregolari e a sensazione di malessere (nausea).

Se dimentica di prendere LEVOFLOXACINA GET compresse

Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena si ricorda a meno che non sia ora di prendere la dose successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Pagina 5 di 8

Se interrompe il trattamento con LEVOFLOXACINA GET compresse

Non smetta di prendere Levofloxacina GET compresse solo perché si sente meglio. E' importante che lei completi il ciclo di compresse che le ha prescritto il medico. Se dovesse smettere di prendere troppo presto le compresse, l'infezione può manifestarsi di nuovo e le condizioni possono peggiorare o i batteri possono sviluppare delle resistenze al medicinale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Levofloxacina GET può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Di norma, questi effetti sono di grado lieve o moderato e spesso scompaiono dopo poco tempo.

La valutazione sulla frequenza degli effetti indesiderati si basa sulla seguente classificazione:

Molto comune:	più di 1 paziente su 10
Comune:	da 1 a 10 pazienti su 100
Non comune:	da 1 a 10 pazienti su 1.000
Raro:	da 1 a 10 pazienti su 10.000
Molto raro:	meno di 1 paziente su 10.000
Frequenza non nota: la frequenza non può essere valutata sulla base dei dati disponibili	

Possibili effetti indesiderati:

Comuni

- Defecazione continua, liquida (diarrea), senso di malessere (nausea)
- Aumento dei livelli nel sangue di certi enzimi epatici

Non comuni

- Riduzione del numero di globuli bianchi (leucopenia), aumento nel numero di certe cellule del sangue (eosinofilia)
- Vertigini, cefalea, sonnolenza
- Senso di vertigine o "giramento di testa" (vertigini)
- Vomito, mal di stomaco, disturbi digestivi, aria (flatulenza), costipazione
- Segni di ridotta funzione renale (livelli ematici elevati di creatinina)
- Eruzione cutanea, prurito
- Perdita di appetito
- Infezioni fungine ed infezioni batteriche resistenti alla levofloxacina
- Debolezza generale
- Segni di ridotta funzione epatica (livelli ematici elevati di bilirubina)
- Problemi di sonno, nervosismo

Raro

- Battito cardiaco accelerato (tachicardia)
- Calo nel numero delle piastrine ematiche (trombocitopenia), che porta ad una tendenza alla formazione di lividi ed al sanguinamento
- Calo del numero di certi globuli bianchi (neutropenia)
- Attacchi epilettici, tremore, sensazione di formicolio alle mani
- Spasmo bronchiale (vie aeree dei polmoni), mancanza di respiro
- Diarrea sanguigna, che in casi molto rari può essere un segno di infiammazione intestinale
- Eruzione cutanea con arrossamento e prurigine (orticaria)
- Dolore tendineo (vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con Levofloxacina GET"), compresa infiammazione tendinea (per es. tendine di Achille), dolore articolare, dolore muscolare
- Calo della pressione sanguigna

- Stato mentale alterato (disturbo psicotico), depressione, confusione, agitazione, ansia

Molto raro

- Grave calo del numero di certi globuli bianchi (agranulocitosi). Questo porta a sintomi gravi (febbre persistente o ricorrente, mal di gola e peggioramento dello stato di salute)
- Lesione nervosa (per es. ridotto senso del tatto, sintomo paralitico)
- Disturbi o perdita del senso del gusto, disturbi o perdita del senso dell'olfatto
- Alterazioni della visione
- Disturbi all'udito
- Reazioni allergiche polmonari (polmonite allergica)
- Insufficienza renale acuta, per es. a causa di reazioni renali allergiche (nefrite interstiziale)
- Gonfiore della pelle e delle membrane mucose, per es. nel viso ed in gola (edema angioneurotico)
- Fotosensibilizzazione della pelle al sole ed ai raggi ultravioletti
- Rottura tendinea (vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con Levofloxacina GET"); questo effetto indesiderato potrebbe comparire entro 48 ore dall'inizio del trattamento e colpire entrambi i lati del corpo.
- Debolezza muscolare, che può avere una rilevanza particolare in pazienti con miastenia grave (una rara malattia del sistema nervoso)
- Diminuzione del glucosio ematico (ipoglicemia), in particolare in pazienti diabetici (vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con Levofloxacina GET"). Sintomi dell'ipoglicemia possono essere: appetito vorace, nervosismo, sudorazione, tremore.
- Febbre
- Shock anafilattico (grave reazione di ipersensibilità, vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con levofloxacina GET")
 - Reazioni anafilattiche e di ipersensibilità similari possono talvolta intervenire già dopo la prima dose.
- Infiammazione del fegato
- Reazioni psicotiche con comportamento autolesionistico compresi pensieri od azioni suicidari (vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con Levofloxacina GET"); allucinazioni.

Frequenza non nota:

- Problemi cardiaci; ritmo cardiaco anormale accelerato, ritmo cardiaco irregolare per la vita, alterazione del ritmo cardiaco (chiamato "prolungamento dell'intervallo QT", visualizzato all' ECG, attività elettrica del cuore)
- Calo nel numero di tutti i tipi di cellule del sangue (pancitopenia); diminuzione dei globuli rossi dovuta a danno delle cellule ematiche (anemia emolitica)
- Tintinnii nell'orecchio (tinnito)
- Gravi reazioni cutanee e delle membrane mucose anche con formazione di bolle (necrolisi epidermale tossica, sindrome di Stevens-Johnson, eritema multiforme)
- Eccessiva sudorazione
- Danno muscolare (rabdomiolisi)
- Dolorazione (compreso dolore alla schiena, al petto ed alle estremità)
- Disturbi di ipersensibilizzazione
- Ingiallimento della pelle e del bianco degli occhi (ittero) e grave danno epatico, compresi casi di insufficienza epatica acuta. Questi sintomi sono stati riportati con la levofloxacina (vedere paragrafo "Faccia particolare attenzione con Levofloxacina GET") principalmente in pazienti con gravi malattie sottostanti (per es. sepsi).

Attenzione

Reazioni a carico della cute e delle membrane mucose possono comparire talvolta dopo la prima dose.

Altri effetti indesiderati che sono stati associati alla somministrazione di fluorochinoloni:

- Disturbi del movimento e della coordinazione muscolare
- Reazioni di ipersensibilità dei piccoli vasi sanguigni (vascolite allergica)
- Attacchi di porfiria in pazienti con porfiria pregressa (una malattia metabolica molto rara).

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico od il farmacista.

Si rivolga immediatamente al medico, se un effetto indesiderato si manifesta improvvisamente o peggiora rapidamente, in quanto certe reazioni avverse ai medicinali (per es. la colite pseudomembranosa, alcune alterazioni ematiche, gravi reazioni anafilattiche od anafilattoidi, gravi disturbi del fegato e gravi alterazioni cutanee) possono essere pericolose per la vita. In tali casi non continui a prendere il farmaco senza consiglio medico.

5. COME CONSERVARE LEVOFLOXACINA GET COMPRESSE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione ma è meglio conservare levofloxacina GET nel blister e nella scatola originali ed in luogo asciutto.

Non usi Levofloxacina GET compresse dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sul foglio di alluminio.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene LEVOFLOXACINA GET

Il principio attivo è la levofloxacina. Ogni compressa di Levofloxacina GET 250 mg compresse contiene 250 mg di levofloxacina ed ogni compressa di Levofloxacina GET 500 mg compresse contiene 500 mg di levofloxacina.

Gli eccipienti sono:

- per il nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone, ipromellosa, talco, magnesio stearato.
- per il rivestimento: ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400, talco, ferro ossido giallo, ferro ossido rosso.

Descrizione dell'aspetto di LEVOFLOXACINA GET e contenuto della confezione

Astuccio contenente un blister da 5 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

GET Srl – Via Dante Alighieri, 73 – Sanremo (IM)

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

PSI Supply nv Axxes Business Park, Guldensporenpark 22, Block C 9820 Merelbeke Belgio

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'agenzia italiana del farmaco: 27/11/2012