

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Fluimucil tosse sedativo 1,8 mg/ml sciroppo Cloperastina fendizoato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Fluimucil tosse sedativo e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Fluimucil tosse sedativo
3. Come prendere Fluimucil tosse sedativo
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Fluimucil tosse sedativo
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Fluimucil tosse sedativo e a cosa serve

Fluimucil tosse sedativo è un medicinale che agisce come sedativo della tosse.

Fluimucil tosse sedativo si usa per il trattamento sedativo della tosse.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Fluimucil Tosse Sedativo

Non prenda Fluimucil Tosse Sedativo

- se è allergico alla cloperastina fendizoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno (vedere "Gravidanza e allattamento")
- nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Fluimucil tosse sedativo. E' consigliata cautela nell'uso

- se soffre di pressione troppo alta all'interno dell'occhio (elevata pressione intraoculare o glaucoma);
- se soffre per un ingrossamento benigno della prostata (ipertrofia prostatica);
- se ha problemi nell'urinare (ostruzione della vescica);
- se si assumono altri medicinali, vedere "Altri medicinali e Fluimucil Tosse Sedativo)

Altri medicinali e Fluimucil tosse sedativo

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di Fluimucil tosse sedativo con:

- medicinali per il trattamento delle allergie;
- medicinali anticolinergici (che contrastano gli effetti fisiologici di una sostanza prodotta dall'organismo chiamata acetilcolina);
- medicinali con effetto sedativo.

Fluimucil tosse sedativo con cibi ed alcol

Non assuma Fluimucil tosse sedativo durante i pasti (vedere "Come prendere Fluimucil tosse sedativo").

Eviti l'assunzione di bevande alcoliche durante il trattamento con Fluimucil tosse sedativo.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Eviti l'assunzione di Fluimucil tosse sedativo nei primi mesi di gravidanza; nell'ulteriore periodo assumi questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e solo sotto il diretto controllo del medico.

Non assumi Fluimucil tosse sedativo durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Poiché il medicinale può, anche se raramente, causare sonnolenza, tenga conto di ciò se intende guidare veicoli o effettuare operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza.

Fluimucil tosse sedativo contiene saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 1,687 g di saccarosio per dose da 3,75 ml (tacca "Bambini") e 3,375 g di saccarosio per dose da 7,5 ml (tacca "Adulti"). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Fluimucil tosse sedativo contiene Etanolo (contenuto nell'aroma banana)

Questo medicinale contiene 0,0011 ml di alcol (etanolo) in ogni dose da 3,75 ml (tacca "Bambini") e 0,0022 ml di alcol (etanolo) in ogni dose da 7,5 ml (tacca "Adulti").

La quantità in una dose di questo medicinale è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 di vino.

La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

Fluimucil Tosse Sedativo contiene Propilene Glicole (contenuto nell'aroma banana)

Questo medicinale contiene 8,6 mg di propilene glicole in 3,75 ml (tacca "Bambini") e 17,3 mg di propilene glicole in 7,5 ml (tacca "Adulti").

Fluimucil Tosse sedativo contiene Sodio (contenuto nella carmellosa sodica)

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Fluimucil tosse sedativo contiene paraidrossibenzoati

Questo medicinale contiene metil-para-idrossibenzoato e propil-para-idrossibenzoato (E218 ed E216) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come prendere Fluimucil tosse sedativo

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Durata del trattamento: 7 giorni. Se non si notano risultati apprezzabili si consiglia di consultare il medico.

Le dosi raccomandate sono:

Adulti: 1 misurino la mattina, 1 misurino il pomeriggio, 2 misurini la sera prima di coricarsi (tacca "Adulti" del dosatore incluso nella confezione; una tacca "Adulti" corrisponde a 7,5 ml di sciroppo).

Uso nei bambini

Bambini dopo i 2 anni: 1 misurino la mattina, 1 misurino il pomeriggio, 2 misurini la sera prima di coricarsi (tacca "Bambini" del dosatore incluso nella confezione; una tacca "Bambini" corrisponde a 3,75 ml di sciroppo).

Bambini al di sotto dei 2 anni:

l'uso di Fluimucil Tosse Sedativo è controindicato al di sotto dei due anni, vedere "Cosa deve sapere prima di prendere Fluimucil Tosse Sedativo".

Il medico raccomanda l'assunzione del medicinale durante i pasti.

Istruzioni per l'apertura del flacone sciroppo

1. Avvitare il tappo prima dell'uso.

2. Premere sulla capsula e svitare nel senso indicato dalla freccia.

3. Per richiudere il flacone, avviti a fondo in senso contrario all'apertura.

Se prende più Fluimucil tosse sedativo di quanto deve

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di Fluimucil tosse sedativo avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Fluimucil tosse sedativo

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Disturbi gastrointestinali, di natura lieve, transitori si possono verificare con Fluimucil Tosse Sedativo.

Non comuni (possono interessare fino a 1 su 100 persone)

- sonnolenza,
- bocca secca.

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- reazioni di ipersensibilità comprese gravi reazioni allergiche a rapida comparsa (reazione anafilattica/anafilattoide),
- orticaria.
- eritema.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Fluimucil tosse sedativo

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Fluimucil tosse sedativo

- Il principio attivo è cloperastina fendizoato. 100 ml di sciroppo contengono 354 mg di cloperastina fendizoato (pari a 180 mg di cloperastina).
- Gli altri componenti sono: **saccarosio**, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, **metil-para-idrossibenzoato**, poliossil-40-stearato, **propil-para-idrossibenzoato**, essenza di banana (contenente **etanolo** e **propilene glicole**), acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Fluimucil tosse sedativo e contenuto della confezione

Fluimucil tosse sedativo si presenta sotto forma di sciroppo.
Il contenuto della confezione è un flacone da 200 ml con un misurino.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)

Produttore

Zambon S.p.A. - Via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ...

Agenzia Italiana del Farmaco