



**PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- **per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista**
- **consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.**

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

VISUSTRIN 0,1% collirio, soluzione

COMPOSIZIONE

10 ml di collirio contengono:

Principio attivo: tetrizolina cloridrato 10 mg.

Eccipienti: Acido bórico; sodio cloruro; borace; benzalconio cloruro; sodio edetato; acqua depurata.

COME SI PRESENTA

VISUSTRIN si presenta in forma di collirio, soluzione.

Il contenuto della confezione è un flacone da 10 ml.

CHE COSA È

VISUSTRIN è un farmaco ad attività simpaticomimetica, impiegato come decongestionante a livello oculare.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare AIC:

Pietrasanta Pharma S.p.A.

Via San Francesco, 67 - Viareggio (LU)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva 8- 56121 Pisa

PERCHÈ SI USA

Visustrin si usa in caso di : arrossamento, prurito, bruciore, gonfiore della congiuntiva.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità individuale accertata al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non deve essere usato da soggetti con glaucoma o con altre gravi malattie dell'occhio e nei bambini sotto i tre anni.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Nelle donne in stato di gravidanza o durante l'allattamento il prodotto va usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel

VISUSTRIN-FOGLETTO ILLUSTRATIVO

Pagina 1 di 3

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).



proprio caso. Consultare il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

PRECAUZIONI PER L'USO

La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state accertate. L'uso nei bambini al di sopra dei tre anni di età richiede l'approvazione del medico (vedere **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**).

Non ottenendo sollievo entro le 48 ore dall' inizio del trattamento, sospendere l' uso e rivolgersi al proprio medico.

Il prodotto se viene ingerito accidentalmente o se impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive può determinare fenomeni tossici.

Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate.

Se dopo un breve periodo di trattamento i sintomi persistono o si aggravano consultare il medico; in ogni caso, il prodotto non deve essere impiegato per più di quattro giorni consecutivi, dato che possono verificarsi, in caso contrario, effetti indesiderati.

Rivolgersi al medico in caso di infezioni, pus, corpi estranei nell' occhio, danni meccanici, chimici e da calore. Il prodotto, pur presentando uno scarso assorbimento generale, deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da pressione sanguigna alta, problemi alla tiroide, disturbi cardiaci e iperglicemia (diabete) e nei soggetti in corso di trattamento con farmaci antidepressivi.

Può causare irritazione agli occhi.

Evitare il contatto con lenti a contatto morbide. Togliere le lenti a contatto prima dell'applicazione e attendere almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

Attenersi con scrupolo alle dosi consigliate.

Tenere lontano dalla portata dei bambini poichè l'ingestione accidentale può provocare sedazione spiccata.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Non sono note interazioni farmacologiche. Tuttavia se state usando altri medicinali chiedete consiglio al farmacista o consultate il vostro medico.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Quanto

Attenzione non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.

SOLO PER ADULTI. L'USO NEI BAMBINI AL DI SOPRA DEI TRE ANNI DI ETÀ RICHIEDE L'APPROVAZIONE DEL MEDICO.

Il dosaggio raccomandato è di 1-2 gocce in ogni occhio due o tre volte al giorno.

(vedere PRECAUZIONI PER L'USO).

Quando e per quanto tempo

Non usare per più di quattro giorni .

VISUSTRIN-FOGLETTO ILLUSTRATIVO

Pagina 2 di 3

Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di sovradosaggio, sospendete il trattamento e avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Con l'uso del prodotto sono stati riportati: dilatazione pupillare, effetti di assorbimento generali (pressione sanguigna alta, disturbi cardiaci, iperglicemia), aumento della pressione endoculare, nausea, mal di testa.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Da conservarsi a temperatura non superiore a 25 °C.

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare il flacone 30 giorni dopo la prima apertura.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Agosto 2013