

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

CANGIL  
1% crema  
Clotrimazolo

### PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

\*per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista

\* consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

### CHE COS'È

CANGIL è un antimicotico (antifungino) per uso cutaneo, agisce cioè localmente eliminando i funghi della pelle.

### PERCHÉ SI USA

CANGIL si usa per il trattamento delle micosi (funghi) della pelle e delle pieghe cutanee, come pitiriasi versicolore, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità al clotrimazolo o ad uno qualsiasi degli eccipienti del prodotto.

### Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico.

Gravidanza (vedere cosa fare durante la gravidanza e allattamento)

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato (recidive di micosi).

### Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza il clotrimazolo deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

### PRECAUZIONI PER L'USO

Nelle dermatiti da pannolino, si sconsiglia l'impiego di pannolini ad effetto occlusorio dopo l'applicazione del farmaco.

### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Non sono noti medicinali o alimenti che possano modificare l'effetto del medicinale.

### È IMPORTANTE SAPERE CHE

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione con manifestazioni eritematose (rossore localizzato) e prurito.

In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

Consultare il medico anche in caso di recidive.

### Informazioni importanti su alcuni eccipienti di CANGIL

CANGIL crema contiene alcool cetostearilico, che può causare reazioni cutanee locali (es: dermatite da contatto)

### **Note di educazione sanitaria**

Per prevenire la micosi e le sue recidive è utile seguire alcune norme di carattere igienico sanitario, quali:

- Nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere di albergo etc. evitare di camminare a piedi nudi.
- Per chi pratica sport è importante utilizzare calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente.
- Limitare l'utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche.
- La biancheria intima va cambiata frequentemente, come pure gli asciugamani.
- Nel neonato, evitare il ristagno di urina o feci sulla cute cambiando frequentemente il pannolino.
- Sottoporre cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell'ambiente domestico.
- Qualora un membro della famiglia manifesti una micosi è consigliabile osservare ulteriori precauzioni igieniche, come tenere separati gli indumenti e lavarli ad elevata temperatura.

### **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

La crema è elettivamente indicata per il trattamento delle zone cutanee glabre (senza peli).

### **Quanto**

CANGIL crema va applicato in piccole quantità 2-3 volte al giorno, in corrispondenza delle zone affette.

Considerata l'elevata attività fungicida del clotrimazolo, è di norma sufficiente l'applicazione di una piccola quantità di crema per il trattamento di una superficie della grandezza del palmo di una mano.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico

### **Quando e per quanto tempo**

In genere, per la scomparsa delle manifestazioni, è sufficiente un periodo di trattamento di tre-quattro settimane. Ai fini di consolidare i risultati terapeutici ottenuti ed evitare reinfezioni, è opportuno proseguire la terapia con CANGIL crema per almeno 2 settimane dopo la scomparsa delle manifestazioni.

Dopo tre-quattro settimane di impiego continuativo senza risultati apprezzabili, consultare il medico. Consultate il medico anche se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Come**

CANGIL crema va applicato frizionando leggermente, dopo aver lavato ed asciugato accuratamente la parte.

### **COSA FARE SE AVETE APPLICATO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

Non sono stati segnalati effetti tossici del clotrimazolo, riferibili ad applicazioni di dosi eccessive del medicinale.

In caso di ingestione accidentale di CANGIL crema avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

### **COSA FARE SE AVETE DIMENTICATO DI PRENDERE UNA O PIÙ DOSI**

Continuare il trattamento come da posologia consigliata.

### **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, CANGIL crema può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Le reazioni avverse elencate sotto derivano da segnalazioni spontanee e non ne è pertanto possibile un'organizzazione per categorie di frequenza.

*Disturbi del sistema immunitario:* reazione allergica (sincope, ipotensione, dispnea, orticaria).

*Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:* bolle, fastidio/dolore, edema, irritazione, desquamazione, prurito, eruzione cutanea, bruciore.

*Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.*

*E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.*

*Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B)*

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato

#### **Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini**

#### **COMPOSIZIONE**

100 g di crema contengono:

Principio attivo: Clotrimazolo 1 g.

Eccipienti: Sorbitano monostearato, polisorbato 60, spermaceti, **alcool cetilstearyllico**, ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata.

#### **COME SI PRESENTA**

CANGIL si presenta in forma di crema per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 30 g

#### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Epifarma S.r.l. – Via San Rocco, 6 – Episcopia (Potenza)

#### **PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

*E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.*

#### **Revisione del Foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco**

19/03/2013