

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente Destrometorfano Bromidrato Zentiva 15 mg capsule molli

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5-7 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Destrometorfano Bromidrato Zentiva e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Destrometorfano Bromidrato Zentiva
3. Come prendere Destrometorfano Bromidrato Zentiva
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Destrometorfano Bromidrato Zentiva
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Destrometorfano Bromidrato Zentiva e a cosa serve

Destrometorfano Bromidrato Zentiva è una specialità con proprietà sedative della tosse causata dall'irritazione delle mucose della gola e/o dei bronchi.

Il principio attivo di Destrometorfano Bromidrato Zentiva è il destrometorfano, una sostanza che calma la tosse.

Destrometorfano Bromidrato Zentiva si usa per calmare la tosse.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5-7 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Destrometorfano Bromidrato Zentiva

Non prenda Destrometorfano Bromidrato Zentiva

- Se è allergico al destrometorfano bromidrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6;
- Se ha un'età inferiore ai 6 anni;
- Se è affetto da asma bronchiale;

- Se ha difficoltà a respirare (insufficienza respiratoria);
- Se sta allattando
- Se sta assumendo o ha assunto nelle due settimane precedenti al trattamento con questo medicinale, farmaci contro la depressione (MAO Inibitori) (vedere “Altri medicinali e Destrometorfano Bromidrato Zentiva”);
- Se assume contemporaneamente bevande alcoliche.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Destrometorfano Bromidrato Zentiva:

- Se soffre d'asma, poiché l'uso di Destrometorfano Bromidrato Zentiva non è consigliato nei pazienti asmatici;
- Se è in stato di gravidanza (vedere “Gravidanza e allattamento”);
- Se soffre di problemi ai reni o al fegato (compromissione renale o epatica), deve ridurre la dose o gli intervalli tra le dosi;
- Se ha una tosse produttiva con quantità considerevoli di muco;
- Se ha una tosse cronica.

Utilizzi questo medicinale solo come raccomandato. Non superi le dosi consigliate, in quanto sono stati riportati casi di abuso di destrometorfano, compresi casi in bambini ed adolescenti. La maggioranza dei casi di abuso riguardava pazienti con una storia di alcolismo e/o abuso di stupefacenti e/o disturbi psichiatrici.

Dopo 5-7 giorni di trattamento senza risultati apprezzabili, consulti il medico. Non prolunghi il trattamento oltre questo periodo di tempo. Non usi il medicinale per sopprimere la tosse cronica.

Bambini

Somministri il medicinale ai bambini dai 6 di età in su solo dopo aver consultato il medico del suo bambino, che valuterà l'effettiva necessità e ne supervisionerà il trattamento.

Altri medicinali e Destrometorfano Bromidrato Zentiva

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Non prenda Destrometorfano Bromidrato Zentiva contemporaneamente o nelle due settimane successive all'interruzione di medicinali contro la depressione: antidepressivi inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) (vedere “Non prenda Destrometorfano Bromidrato Zentiva”).

In particolare informi il medico se lei sta assumendo o ha recentemente assunto:

- Medicinali per trattare la depressione come fluoxetina, paroxetina, sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2 "Non prenda Destrometorfano Bromidrato Zentiva");
- Medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza nei casi di dipendenza (metadone);
- Medicinali per trattare le malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina, perfenazina);
- Medicinali per trattare i disturbi del ritmo del cuore (amiodarone, chinidina, propafenone);
- Medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
- Medicinali per ridurre il livello di calcio nel sangue e trattare una disfunzione dell'organismo dovuta ad una ridotta secrezione dell'ormone che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;
- Medicinali usati per impedire lo sviluppo dei funghi (miceti) (terbinafina).

Destrometorfano Bromidrato Zentiva con alcol

Non assuma alcol durante la terapia con Destrometorfano Bromidrato Zentiva.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Durante la gravidanza, usi il medicinale solo in caso di effettiva necessità e solo dopo avere consultato il medico.

Non assuma questo medicinale se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Poiché il medicinale può dare sonnolenza, capogiri o alterare lo stato di vigilanza, ne tenga conto se utilizza macchinari che richiedano un'attenta vigilanza. Questi effetti vengono aumentati con l'uso contemporaneo di alcol.

Destrometorfano Bromidrato Zentiva contiene sorbitolo e sodio

Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Destrometorfano Bromidrato Zentiva

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate sono:

Adulti: 1 capsula per volta (pari a 15 mg di destrometorfano bromidrato), fino a 6 capsule nelle 24 ore (pari a 90 mg di destrometorfano bromidrato).

Mastichi la capsula prima di ingoiarla.

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico. Usi il medicinale solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

Se prende più Destrometorfano Bromidrato Zentiva di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Destrometorfano Bromidrato Zentiva, avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino.

Un eventuale sovradosaggio può determinare sintomi come depressione respiratoria (respiro lento o superficiale) e del sistema nervoso centrale, nausea, vomito, disturbi gastrointestinali, sonnolenza, capogiri, senso di vuoto alla testa, stanchezza, disturbi del linguaggio, allucinazioni (sentire e vedere cose che non esistono), movimenti involontari degli occhi (nistagmo), confusione, altri disturbi mentali e altri disturbi quali la sindrome serotoninergica (vedere sezione "Possibili effetti indesiderati").

In caso di sovradosaggio consulti immediatamente un medico o si rivolga al più vicino ospedale. Non si consiglia l'induzione di vomito.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- Sonnolenza;
- Capogiri.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino ad 1 persona su 10):

- Confusione;
- Nausea;
- Vomito;
- Costipazione;
- Stanchezza.

Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000):

- Dipendenza da farmaco.

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- vertigini;
- disturbi del linguaggio;
- movimenti involontari degli occhi (nistagmo);
- disturbo del movimento (distonia), specialmente nei bambini;
- arrossamento con prurito;
- orticaria;
- gonfiore della pelle e delle mucose (angioedema);
- restringimento dei bronchi con difficoltà respiratoria (broncospasmo);
- grave reazione allergica a rapida comparsa (reazione anafilattica);
- eruzione fissa da farmaci;
- malattie mentali (disordini psicotici) incluse allucinazioni.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Destrometorfano Bromidrato Zentiva

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore ai 30°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Destrometorfano Bromidrato Zentiva

- Il principio attivo è destrometorfano bromidrato. Ogni capsula molle contiene 15 mg di destrometorfano bromidrato.
- Gli altri componenti sono: magnesio trisilicato, cioccolato bianco, paraffina liquida, saccarina sodica, aroma di menta, ammonio glicirrinato.
Costituenti dell'involucro: gelatina, **soluzione sorbitolo speciale**, glicerina, aroma di menta, titanio diossido, saccarina sodica, E 141.

Descrizione dell'aspetto di Destrometorfano Bromidrato Zentiva e contenuto della confezione

Destrometorfano Bromidrato Zentiva si presenta sotto forma di capsule molli.

La confezione contiene 16 capsule molli in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Zentiva Italia S.r.l.
Viale L. Bodio, 37/b - IT-20158 Milano (Italia)

Produttore

Sanofi S.p.A.
S.S.17 Km 22
IT-67019 Scoppito (AQ)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: