

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Lisomucil Tosse Irritante 40 mg/ml gocce orali, soluzione pipazetato cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Lisomucil Tosse Irritante e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Lisomucil Tosse Irritante
3. Come prendere Lisomucil Tosse Irritante
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lisomucil Tosse Irritante
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Lisomucil Tosse Irritante e a cosa serve

Lisomucil Tosse Irritante contiene il principio attivo pipazetato, che appartiene alla categoria dei medicinali sedativi della tosse.

Lisomucil Tosse Irritante si usa come calmante (sedativo) della tosse negli adulti e nei bambini al di sopra dei 2 anni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lisomucil Tosse Irritante

Non prenda Lisomucil Tosse Irritante

- se è allergico al pipazetato cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lisomucil Tosse Irritante.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcol etilico può determinare positività ai tests antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

Altri medicinali e Lisomucil Tosse Irritante

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza, usi questo medicinale solo nei casi di effettiva necessità, solo dopo aver consultato il suo medico e sotto il suo diretto controllo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Poiché il medicinale può dare sonnolenza, tenga conto di ciò se deve condurre autoveicoli o usare macchine pericolose.

Lisomucil Tosse Irritante contiene alcol etilico e saccarosio (caramello)

Lisomucil Tosse Irritante gocce contiene alcol etilico.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Lisomucil Tosse Irritante

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate sono:

- Adulti: 15-25 gocce sino a tre volte al giorno.

Uso nei bambini

- da 2 a 6 anni: 8 gocce sino a 3 volte al giorno.

- da 6 a 12 anni: 10 gocce sino a 3 volte al giorno.

- da 12 a 18 anni: 15-20 gocce sino a 3 volte al giorno.

Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.


Diluisca le gocce in un poco di liquido (acqua, succhi di frutta, latte o tè).

Nelle tosse particolarmente resistenti, con peggioramento notturno, prenda l'ultima somministrazione prevista per la giornata prima di andare a letto, onde assicurare il riposo notturno.

Se dopo un breve periodo di trattamento non ottenesse risultati utili, consulti il medico.

Il flaconcino delle gocce è dotato di chiusura avente lo scopo di render difficoltosa l'apertura da parte dei bambini.

Modalità di apertura del flaconcino: applichi una leggera pressione al tappo di plastica e contemporaneamente sviti in senso antiorario (vedi figura).



Per richiudere, giri in senso orario, applicando sempre una leggera pressione al tappo, assicurandosi poi che sia nuovamente ben chiuso.

Se prende più Lisomucil Tosse Irritante di quanto deve

In caso di estremo sovradosaggio, quando venga ingerito un intero flacone in una sola volta, si possono avere nei bambini avvelenamenti con rischio della vita. Per questo motivo faccia bene attenzione alle prescrizioni delle dosi.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Lisomucil Tosse Irritante, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si sono manifestati seguenti effetti indesiderati:

- disturbi del sonno (sia sonnolenza che insonnia),
- nausea,
- vomito,
- orticaria,
- raramente accelerazione del battito del cuore (tachicardia).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lisomucil Tosse Irritante

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lisomucil Tosse Irritante

- Il principio attivo è pipazetato cloridrato. 1 ml (pari a circa 25 gocce) contiene 40 mg di pipazetato cloridrato.
- Gli altri componenti sono: polietilenglicole 400, **alcol etilico**, acido citrico, aroma limone, acido cloridrico, saccarina, sodio idrato, vanillina, caramello solido, acqua distillata.

Descrizione dell'aspetto di Lisomucil Tosse Irritante e contenuto della confezione

Lisomucil Tosse Irritante si presenta sotto forma di gocce per uso orale.

Il contenuto della confezione è un flacone contenente 20 ml di gocce orali.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Sanofi S.p.A. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano

Su licenza:

Meda Pharma GmbH & CO KG
Bad Homburg - Germania

Produttore

A. Nattermann & Cie GmbH
Nattermanallee 1
50829 Colonia (Germania)

Sanofi S.p.A.
Viale Europa, 11 - 21040 Origgio (VA)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco