

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

### Zerinol Gola ribes nero 20 mg pastiglie

ambroxolo cloridrato

#### **Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

- 1 Che cos'è Zerinol Gola ribes nero e a cosa serve
- 2 Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola ribes nero
- 3 Come prendere Zerinol Gola ribes nero
- 4 Possibili effetti indesiderati
- 5 Come conservare Zerinol Gola ribes nero
- 6 Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Zerinol Gola ribes nero e a cosa serve**

Zerinol Gola ribes nero contiene il principio attivo *ambroxolo cloridrato*. Il principio attivo è il componente della pastiglia che dà l'effetto terapeutico richiesto.

Zerinol Gola ribes nero ha un effetto anestetico locale che allevia il dolore del mal di gola acuto.

Zerinol Gola ribes nero si usa per il trattamento sintomatico del dolore acuto nel mal di gola.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola ribes nero**

##### **Non prenda Zerinol Gola ribes nero**

- se è allergico all'ambroxolo cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (vedere paragrafo 6);

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zerinol Gola ribes nero.

- Non deve assumere Zerinol Gola ribes nero per più di 3 giorni. Se ha ancora dei sintomi dopo 3 giorni o se ha la febbre alta, consulti il medico.
- Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di assumere questo medicinale. Si veda anche "Zerinol Gola ribes nero contiene sorbitolo".
- Se è affetto da rare condizioni ereditarie di intolleranza al fruttosio.
- Se ha problemi epatici o renali, si rivolga al medico prima di usare Zerinol Gola ribes nero.

- Zerinol Gola ribes nero non è adatto per il trattamento delle lesioni dolorose della bocca (ad esempio, ulcere o piaghe). Se ha ulcere in bocca, consulti il medico.
- Episodi di respiro corto (dispnea) si possono osservare a causa di una malattia concomitante (ad esempio, gonfiore della gola). Un'altra ragione può essere una sensazione di costrizione alla gola per l'effetto anestetico locale di Zerinol Gola ribes nero. Un'ulteriore causa può essere una reazione allergica, che può anche causare un gonfiore alla bocca e alla gola.
- La gola e la bocca possono risultare meno sensibili del solito (intorpidimento).
- Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi associate alla somministrazione di ambroxolo cloridrato. Se manifesta un rash cutaneo (comprese lesioni di membrane mucose come bocca, gola, naso, occhi, genitali), smetta di prendere Zerinol Gola ribes nero e contatti immediatamente il medico.

### **Bambini**

Se ha meno di 12 anni non deve usare Zerinol Gola ribes nero.

### **Altri medicinali e Zerinol Gola ribes nero**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Ambroxolo passa nel corpo del nascituro. Zerinol Gola ribes nero quindi, non deve essere assunto durante la gravidanza, in particolare nel primo trimestre.

Ambroxolo viene escreto nel latte materno. Zerinol Gola ribes nero quindi, non deve essere assunto durante l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti effetti di Zerinol Gola ribes nero sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

### **Zerinol Gola ribes nero contiene sorbitolo**

Una pastiglia contiene 1,381 g di sorbitolo (8,3 g di sorbitolo per la dose massima giornaliera raccomandata), che è fonte di fruttosio (un tipo di zucchero). Se soffre di intolleranza al fruttosio non deve assumere questo medicinale.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Zerinol Gola ribes nero è adatto per i diabetici. .

## **3. Come prendere Zerinol Gola ribes nero**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Per adulti e bambini sopra i 12 anni, 1 pastiglia da sciogliere in bocca quando ha bisogno di alleviare il dolore. Non assuma più di 6 pastiglie al giorno.

Non usi Zerinol Gola ribes nero per più di 3 giorni. Nel caso persistano sintomi per più di 3 giorni o ha febbre alta, consulti il medico.

Come dimostrano gli studi clinici, l'effetto anestetico locale di Zerinol Gola ribes nero viene raggiunto in 20 minuti e il suo effetto dura per almeno 3 ore.

#### **Se prende più Zerinol Gola ribes nero di quanto deve**

Finora non sono stati segnalati sintomi specifici di sovradosaggio nell'uomo.

In caso di assunzione di troppe pastiglie (più di 6 al giorno) consulti il medico o il farmacista se compaiono dei sintomi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

#### **Se si verifica uno dei seguenti effetti indesiderati interrompa l'assunzione di Zerinol Gola ribes nero e informi immediatamente il medico:**

- reazione allergica con gonfiore localizzato del viso, delle labbra, della bocca, della lingua e/o della gola (angioedema). Ciò può causare una sensazione di costrizione alla gola, difficoltà a deglutire o a respirare;
- il rapido verificarsi di reazioni allergiche che interessano tutto il corpo (reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico).

La gravità delle reazioni allergiche può aumentare se si prende nuovamente il medicinale, o se si prende un altro medicinale con lo stesso principio attivo (vedere paragrafo 2: Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola ribes nero).

Altri effetti indesiderati che si possono verificare:

#### **Comune: può interessare fino a 1 persona su 10**

- Sensazione di malessere (nausea).
- Intorpidimento della bocca, della lingua e della gola (ipoestesia orale e faringea).
- Alterazione del gusto (disgeusia).

#### **Non comune: può interessare fino a 1 persona su 100**

- Diarrea.
- Indigestione (dispepsia).
- Mal di stomaco (dolore alla parte alta dell'addome).
- Secchezza della bocca.

#### **Raro: può interessare fino a 1 persona su 1.000**

- Reazioni di ipersensibilità.
- Rash, orticaria.
- Gola secca.

**Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili**

(una stima precisa della frequenza non è possibile, poiché gli effetti collaterali non si sono verificati in una serie di studi clinici su 1226 pazienti. La categoria di frequenza probabilmente non è maggiore di non comune, ma potrebbe essere inferiore).

- Reazioni anafilattiche, tra cui shock anafilattico, angioedema (rapido sviluppo di gonfiore della pelle, dei tessuti sottocutanei, della mucosa e dei tessuti sottomucosi) e prurito.
- Reazioni avverse cutanee gravi (tra cui eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica e pustolosi esantematica acuta generalizzata).
- Vomito.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Zerinol Gola ribes nero**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister.

La data di scadenza (SCAD.) si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Zerinol Gola ribes nero**

Il principio attivo è ambroxolo cloridrato. Una pastiglia contiene 20 mg di ambroxolo cloridrato.

Gli eccipienti sono:

- aroma ribes nero
- aroma mentolo
- sorbitolo (E420)
- sucralosio
- macrogol 6000
- talco

### **Descrizione dell'aspetto di Zerinol Gola ribes nero 20 mg pastiglie e contenuto della confezione**

Questo medicinale si presenta sotto forma di compresse rotonde, bianche con i bordi smussati.

Entrambi i lati sono piatti.

Le pastiglie sono disponibili in blister in alluminio/alluminio.

Confezioni da 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 pastiglie.  
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Sanofi S.p.A.  
Viale L. Bodio, 37/B  
20158 Milano (Italia)

*Produttore*

Delpharm Reims S.A.S.  
10, rue Colonel Charbonneaux - 51100 Reims - Francia

**Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:**

- Austria: Mucoangin® Johannisbeere
- Belgio/Lussemburgo: Mucoangin® Cassis
- Francia: LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose
- Germania: Mucoangin® gegen Halsschmerzen Waldbeere
- Italia: Zerinol® Gola ribes nero

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**